





令和7年 アブラムシ類有翅虫飛来消長




農業試験場、野菜花き試験場で実施した黄色粘着トラップによる誘殺消長調査の結果です

【コメント】

多くの地点で平年と比べて誘殺頭数が多くなっていますので注意してください。

- ・塩尻市宗賀では、5月第1半旬に初誘殺され、5月下旬から増加し、6月は平年の約2倍の誘殺頭数で推移している。
- ・塩尻市洗馬では、4月第4半旬に初誘殺され、5月第3半旬から急増し、5月の総誘殺頭数は平年の3倍を超える誘殺頭数であった。
- ・小諸市では、調査開始の3月第1半旬誘殺され、5月第3半旬から急増し、6月第3半旬までの総誘殺頭数は平年の4倍を超える誘殺頭数であった。
- ・上田市菅平では、4月第4半旬に初誘殺され、5月第3半旬から増加し、平年と比べやや多い誘殺頭数で推移している。
- ・長野市上ヶ屋では、4月第6半旬に初誘殺され、5月第4半旬から増加し、6月第半旬までの総誘殺頭数は平年の約3倍の誘殺頭数であった。
- ・長野市松代では、調査開始の4月第1半旬から誘殺され、6月第3半旬までの総誘殺頭数は過去3年間平均値の約11倍の誘殺頭数であった。





；