

令和8年 アブラムシ類有翅虫飛来消長

農業試験場、野菜花き試験場で実施した黄色粘着トラップによる誘殺消長調査の結果です

【コメント】

- ・塩尻市宗賀では、4月第3半旬から誘殺され、平年よりも発生は早く、7月第3半旬まで平年よりも多い誘殺数で推移し、6月第6半旬には大きなピークがみられた。
- ・塩尻市洗馬では、4月第2半旬から誘殺され、平年よりも発生は早く、以降は増減しつつ平年よりも多い誘殺数で推移し、6月第6半旬には大ピークがみられた。8月以降は、平年並みから少ない誘殺数で推移している。
- ・小諸市では、4月第2半旬から誘殺され、平年よりも発生は早く、以降は概ね平年並みの誘殺数で推移している。
- ・上田市では、5月第2半旬から誘殺され、平年よりも発生は遅く、6月第6半旬を除き、平年並みから少ない誘殺数で推移している。10月第2半旬から誘殺数が増加した。
- ・富士見町では、5月第1半旬から誘殺され、以後は前年よりも少ない誘殺数で推移し、6月第4半旬で増加後は減少し、少なく推移している（平年値無し）。
- ・長野市上ヶ屋では、4月第4半旬から誘殺され、平年よりも発生は早く、6月第1半旬から7月第1半旬は平年よりも多い誘殺数で推移した。その後は、ほぼ平年並みに推移した後、8月第4半旬から平年よりも多くなり、9月第3半旬に小ピークがみられた。
- ・長野市松代では、4月第2半旬から誘殺され、発生時期は平年並み、誘殺数は6月以降は概ね平年並みであったが、8月第4半旬から9月第2半旬にかけては平年よりも多かった。



