

(別表 1) 指定農薬危被害防止対策推進要領第 2 に基づく指定農薬

指定農薬名	該当銘柄名	対象作物	危被害の対象	留意事項	
合成ピレスロイド剤	シクロサール U 粒剤 2 シクロパック粒剤 トレボン粒剤 トレボンサーフ なげこみトレボン	水 稲	蚕児 魚介類	シクロサール U 粒剤 2・トレボン粒剤は桑園に隣接した水田では絶対に使用せず、桑園と 20m 以上間隔をとること。養魚池に流入するおそれのあるところでは使用しないこと。	
	トレボン粉剤 DL トレボン乳剤 トレボンスカイ MC			指定地域以外では使用しないこと。 (別表 2)	
	MR. ジョーカー粉剤 DL <sup>1)</sup>			蚕児	
	合成ピレスロイド剤	アージェント水和剤 アグロスリン水和剤・乳剤 アディオソ水和剤・乳剤 アディオソフロアブル イカズチ W D G サイハロン水和剤 スカウトフロアブル テルスター水和剤・フロアブル トレボン EW・乳剤・水和剤 パーマチオン水和剤 バイスロイド EW ハクサップ水和剤 フォー ス 粒剤 ペイオフ ME 液剤 マブリック EW・水和剤 20 マブリックナック水和剤 ロディー水和剤・乳剤	水稲以外の作物	蚕児 魚介類	指定地域以外では使用しないこと。 (別表 3)
		MR. ジョーカーEW・水和剤 <sup>1)</sup>			蚕児
		ロビンフッド			桑に付着する恐れのある場所では使用しないこと。
IGR 剤 <sup>2)</sup>	アフームエクセラ顆粒水和剤 アタブロン SC アタブロン乳剤 カウスター乳剤 カスケード乳剤 デミリン水和剤 ノーモルト乳剤 バロックフロアブル ファルコンフロアブル マツチ乳剤 マトリックフロアブル ラノーテール ロムダンフロアブル	野菜 果樹 き たばこ 茶	蚕児	指定地域以外では使用しないこと。 ラノーテールは、蚕に対して長期間強い毒性があるので、IGR 剤指定地域かつ桑園から 1 km 以上離れたところで使うこと。 (別表 3)	
BT 剤 (生菌)	エスマルク DF サブリーナフロアブル ゼンターリ顆粒水和剤 チューンアップ顆粒水和剤 デルフィン顆粒水和剤 バイオマックス DF バシレックス水和剤 ファイブスター顆粒水和剤 フローバック DF	野菜 花き たばこ 普通作物 果樹 茶	蚕児	指定地域以外では使用しないこと。 (別表 4)	

(注) 上記銘柄と同一成分を含有する単剤及び混合剤を含む。

1) 合成ピレスロイド類似化合物

2) アプロード剤は除く(蚕毒が弱い)。ただし、本表の上記銘柄と同一成分を含有する混合剤は指定地域以外では使用しない。

※本表の「該当銘柄名」は、この防除基準に掲載されている農薬名である。