

4. アスパラガス

・殺菌剤

FRAC コード	薬剤名	使用方法	使用時期	使用回数	備考
M1	(銅) Z ボルドー	無人航空機による散布	—	—	

注1) 使用回数はその薬剤の使用回数を記載しており、この他に薬剤に含まれる成分毎に、総使用回数が決められているので、農薬ラベル等を確認してそれを超えないように注意する。

対象病虫害	防除時期	防 除 方 法	注 意 事 項
茎 枯 病	生育期間	1. Z ボルドー8 倍液を 10a 当り 80 散布する。	<ol style="list-style-type: none"> 銅による薬害が出やすいので、高温時の散布や3回以上の連続散布を行わない。 希釈率が低く、薬剤が沈殿しやすいので、散布液をよく攪拌しながらタンクへ流し込む。 散布量が水稻の場合と異なるので注意する。 散布は重ね散布を基本とする。畦に対しては飛行方向、経路に関わらずほぼ均一な散布が可能である。しかし、不整形ほ場や傾斜地ほ場では均一に散布するため、飛行経路を臨機応変に対応する。なお、飛行速度は一定とすること。 ドリフトは条件により5mまで確認されている。散布薬液の飛散によって他作物や自動車等に飛散しないよう注意する。 作業に当たっては、「無人ヘリコプターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン」および「無人マルチローターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン」を遵守し、「産業用無人ヘリコプターによる病虫害防除実施者のための安全対策マニュアル」等を参考にする。