

2. 主要農薬の蚕児に対する中毒型の分類

○印は該当する項目
 ◎印はそのうちでも強い農薬
 ※印は特に注意を必要とする農薬

殺菌剤

農薬名	基準分類 蚕児の症状		中毒型				殺虫力				残留毒性		
			急性型 1時間以内に中毒症状を現す。		亜急性型 2日以内に中毒症状を現す。		慢性型 3~7日後に中毒症状を現す。		急性型		慢性型		長期間残る。
	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	急性	慢性	
アミスター							○			○		○	○
アリエッティC			○				○			○		○	○
アントラコール							○			○		○	○
アンビル							○			○		○	○
イオウ							○			○		○	○
インダード			◎※				○		○	○		◎※	○
エムダイファード							○		○	○		○	○
オリゼメート							○		○	○		○	○
カスミン							○		○	○		○	○
カスラブサイド							○		○	○		○	○
カーゼートPZ			○	○			○		○				○
キタジンP*												○	○
キノンドー			○						○			○	○
キンセツト				○					○			○	○
クブラビットホルテ*				◎					○			○	○
ゲツタード							○			○		○	○
コラトツプ							○			○		○	○
コロナ							○			○		○	○
サプローナル							○			○		○	○
サンヨー							○			○		○	○
ジマンダイセン			◎※						○			◎※	
スコニア							○			○		○	○
スター							○			○		○	○
ストロビード							○			○		○	○
スペットサイド							○			○		○	○
スマブレンンド							○			○		○	○
スマレックス							○			○		○	○
Zボルドー			◎						○			○	○
ダコニール1000							○			○		○	○
ダコレックス							○			○		○	○
ダコレート		○					○			○			○
デラン									○			○	○
ドイツボルドーA			◎※						○			◎※	○
トツプジンM							○			○		○	○
ネビジン							○			○		○	○
バシタツク			◎						○			◎※	

農薬名	基準分類 蚕児の症状	中毒型						殺虫力				残留毒性	
		急性型 1時間以内に中毒症状を現す。		亜急性型 2日以内に中毒症状を現す。		慢性型 3~7日後に中毒症状を現す。		急性型		慢性型		長期間残る。	
		強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	急性	慢性
パースポート						○				○			○
パスワード						○				○			○
バリダシン						○				○			○
ビーム						○				○			○
フェステイバルM*						○				○		○	
フジワント						○	○			○			○
ブルシン						○	○			○			○
フルピカ						○	○			○			○
フロンサイド						○				○			○
ベフラン		◎								○		◎	
ベルクート					○	○			○			◎	
ベンレート						○				○		○	
ベンレートT						○				○			○
ボルドー						○				○		○	
ホライズン						○				○		○	
ポリオキシンA L						○				○			○
ポリオキシンZ						○				○			○
マネージ						○				○			○
モレスタン						○				○			○
モンカット		◎							○			◎	
モンセレン					○			○		○			○
ラブサイド				○				○				○	
ラリード						○				○			○
リゾレックス						○				○			○
ロブラー						○				○			○

殺虫劑

農薬名	基準分類 蚕児の症状	中毒型						殺虫力				残留毒性	
		急性型 1時間以内に中毒症状を現す。		亜急性型 2日以内に中毒症状を現す。		慢性型 3~7日後に中毒症状を現す。		急性型		慢性型		長期間残る。	
		強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	急性	慢性
フ オ 一 ス	◎					○	◎			○	○	○	○
ベ ス ト ガ 一 ド	◎※			◎		○	◎※	◎	○	○	○	○	○
ベ ジ ホ ド ナ				◎※		○	◎※	○	○	○	○	○	○
マ イ ト ク リ 一 ソ				○		○	○	○	○	○	○	○	○
マ イ ト コ 一 ネ				○		○	○	○	○	○	○	○	○
マ ト リ ツ ク	○			○		○	○	○	○	○	○	○	○
マ ラ ゾ ノ				○		○	○	○	○	○	○	○	○
ミ ク ロ デ ナ ポ ノ							○	○	○	○	○	○	○
M R . ジ ョ 一 カ 一 *	◎※					○	○	○	○	○	○	○	○
モ ス ピ ラ ヌ	◎※			○		○	○	○	○	○	○	○	○
ラ ン ネ 一 ト		◎		○		○	○	○	○	○	○	○	○
ロ ム ダ ヌ				○			○	○	○	○	○	○	○

除草剤

農薬名	基準分類 蚕児の症状	中毒型						殺虫力				残留毒性	
		急性型 1時間以内に中毒症状を現す。		亜急性型 2日以内に中毒症状を現す。		慢性型 3~7日後に中毒症状を現す。		急性型		慢性型		長期間残る。	
		強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	急性	慢性
ソ ル ネ ッ ト						○				○			○

【注意事項】

* : 既に登録は失効しているが、登録失効から1年以内の場合に限り、参考として掲載した。

注) 残留性から推定される安全日数は、次項以降の表を参照する。