

7. そ ば

・殺菌剤（参考農薬）

| FRAC コード | 薬剤名 | 使用方法 | 使用時期 | 使用回数 | 備考 |
|-------------|----------|--------|------|------|----|
| 14 | リゾレックス粉剤 | 全面土壌混和 | は種前 | 1回 | |

・殺虫剤（参考農薬）

| IRAC コード | 薬剤名 | 使用方法 | 使用時期 | 使用回数 | 備考 |
|-------------|------------|------|-----------------|------|----|
| 11 | ゼンターリ顆粒水和剤 | 散布 | 発生初期(但し、収穫前日まで) | - | |

注1) 使用回数はその薬剤の使用回数を記載しており、この他に薬剤に含まれる成分毎に、総使用回数が決めているので、農薬ラベル等を確認してそれを超えないように注意する。

| 病害虫名 | 防除時期 | 防 除 方 法 | 注 意 事 項 |
|---------|--------|---|-------------------------------|
| 立 枯 病 | は 種 前 | [参考農薬] 1. は種前にリゾレックス粉剤を 10 a 当り 20kg、全面に均一散布し、土壌とよく混和する。 | |
| ハスモンヨトウ | 幼虫発生初期 | [参考農薬] 1. ゼンターリ顆粒水和剤の 2,000 倍液を 10 a 当り 1500散布する。 | 1. ゼンターリは蚕毒に特に注意する（特別指導事項参照）。 |

8. あわ、きび、ひえ、はとむぎ

・殺虫剤（参考農薬）

| IRAC コード | 薬剤名 | 使用方法 | 使用時期 | 使用回数 | 備考 |
|-------------|-----------|------|-----------------|------|------------|
| 11 | トアロー水和剤CT | 散布 | 発生初期(但し、収穫前日まで) | - | 雑穀類（ひえを除く） |
| | | 散布 | 発生初期(但し、収穫前日まで) | - | ひえ |

注1) 使用回数はその薬剤の使用回数を記載しており、この他に薬剤に含まれる成分毎に、総使用回数が決めているので、農薬ラベル等を確認してそれを超えないように注意する。

注2) 雑穀類(ひえを除く)は 1,000 倍、ひえは 500~1,000 倍の登録である。

注3) 農薬登録上の作物名が標記の作物名と異なる場合、備考欄に記載した。

| 病害虫名 | 防除時期 | 防 除 方 法 | 注 意 事 項 |
|--------|--------|---|------------------|
| アワノメイガ | 幼虫発生初期 | [参考農薬] 1. トアロー水和剤CTの 1,000 倍液を 10 a 当り 60~1500/10a 散布する。 | 1. トアローは蚕毒に注意する。 |