

28. モロヘイヤ

・殺虫剤（参考農薬）

| IRAC コード | 薬剤名 | 使用方法 | 使用時期 | 使用回数 | 備考 |
|-------------|------------|------|----------|------|----|
| 6 | コロマイト乳剤 | 散布 | 収穫前日まで | 1回 | |
| 1 | スミチオン乳剤 | 散布 | 収穫14日前まで | 2回以内 | |
| 21 | ダニトロンフロアブル | 散布 | 収穫7日前まで | 1回 | |

注1) 使用回数はその薬剤の使用回数を記載しており、この他に薬剤に含まれる成分毎に、総使用回数が決められているので、農薬ラベル等を確認してそれを超えないように注意する。

注2) 薬剤抵抗性の出現を防ぐため、「FRACコード」や「IRACコード」を参考にしながら他系統剤とのローテーション使用を心掛ける（「薬剤抵抗性管理」参照）。

注3) 蚕毒・魚毒については、「56. 野菜類の総括注意」も参照する。

| 病害虫名 | 防除時期 | 防 除 方 法 | 注 意 事 項 |
|-------|------|---|--|
| ハダニ類 | 生育期間 | [参考農薬] 1. コロマイト乳剤1,500倍液、又はダニトロンフロアブル2,000倍液を散布する。 | 1. コロマイトは蚕毒及び魚毒に、ダニトロンは魚毒に特に注意する（特別指導事項参照）。 2. ダニトロンは蚕毒に注意する。 |
| マメコガネ | 生育期間 | [参考農薬] 1. スミチオン乳剤1,000倍液を散布する。 | |