

52. たらのき

・殺菌剤 (参考農薬)

FRAC コード	薬剤名	使用方法	使用時期	使用回数	備考
11+4	ユニフォーム粒剤	土壌表面散布	収穫終了後（苗の場合は植付後）～落葉前（但し、収穫60日前まで）	2回以内	

・殺虫剤 (参考農薬)

IRAC コード	薬剤名	使用方法	使用時期	使用回数	備考
1	スミチオン乳剤	樹幹散布	3月～5月（株養成期）	2回以内	

注1) 使用回数はその薬剤の使用回数を記載しており、この他に薬剤に含まれる成分毎に、総使用回数が決められているので、農薬ラベル等を確認してそれを超えないように注意する。

注2) 薬剤抵抗性の出現を防ぐため、「FRACコード」や「IRACコード」を参考にしながら他系統剤とのローテーション使用を心掛ける（「薬剤抵抗性管理」参照）。

病虫害名（F：菌類病、B：細菌病、V：ウイルス病、O：その他の病原体）

病虫害名	防除時期	防除方法	注意事項
立枯疫病 (F)	生育期間	[参考農薬] 1. ユニフォーム粒剤を10a当り20kg土壌表面に散布する。	
センノカミキリ幼虫	株養成期	[参考農薬] 1. スミチオン乳剤100倍液を樹幹に散布する。	