



家畜衛生情報

岡山県（国内7例目）・和歌山県（国内8例目）の農場で高病原性鳥インフルエンザが発生！！

本日（11/11）、岡山県倉敷市と和歌山県白浜町の家きん農場で高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜が確認されました。

既に県内にも渡り鳥が飛来しており、農場へのウイルス侵入リスクが高まっています。飼養衛生管理の遵守の自己点検を確実に実施するとともに、万が一、不備が確認された場合は、直ちに改善してください。

所在地	岡山県 倉敷市	和歌山県 白浜町
飼養状況	採卵鶏（約 3.4 万羽）	あひる等（約 60 羽）
経緯	<ul style="list-style-type: none"> ・11月10日（木曜日）、家きんの異状（岡山県）、家きんの死亡（和歌山県）がみられる旨の通報を受けて、当該農場に対し移動の自粛を要請するとともに農場への立入検査を実施。簡易検査陽性であることが判明 ・11月11日（金曜日）、遺伝子検査を実施した結果、高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜であることを確認。 	

消毒方法の注意点

■逆性石けんは、低温で、消毒効果が減弱します

<対策>

- ① 微温湯で希釈し、できる限り交換の頻度を高める。
- ② 飽和石灰水（石灰が溶けきれず残っている状態の上澄み液）で希釈する。

■用法・用量に示されている範囲で、濃い濃度で使用する。

■酸性とアルカリ性の消毒薬を同時に使用しない

- ・例えば、ビルコンSと消石灰の併用は×
- ・塩素系は他と混ぜると毒性のある塩素ガスを発生することがありますので、ご注意ください。

<最適 pH が酸性の消毒薬>

ビルコンS、塩素系イソシアヌル酸塩、ヨード系消毒薬

<最適 pH がアルカリ性の消毒薬>

逆性石けん、次亜塩素酸ナトリウム、アルデヒド系、消石灰

使用後は
汚れを落としてから
消毒槽で
漬け置き消毒を！



衛生管理区域専用



各家きん舎ごとの専用

家畜保健衛生所	電話番号	家畜保健衛生所	電話番号	家畜保健衛生所	電話番号
佐久	0267-62-4123	飯田	0265-53-0439	長野	026-226-0923
伊那	0265-72-2782	松本	0263-47-3223	県庁家畜防疫対策室	026-235-7232