

家畜衛生広報いいだ

長野県飯田家畜保健衛生所
飯伊家畜畜産物衛生指導協会
TEL : 0265-53-0439, 0440
FAX : 0265-53-0441
E-mail : iidakachiku@pref.nagano.lg.jp
http://www.pref.nagano.lg.jp/iidakachiku/

R2(2020)12.18 発行 2020_No.9

鳥インフルエンザウイルスを侵入させないため 【防疫対策の再徹底】をお願いします！



国内1例目の高病原性鳥インフルエンザウイルスのウイルス株は、鶏に対して高い致死性を示し、過去の株よりも死亡するまでの期間が長い傾向です。

そのため、ウイルスの排泄期間が長くなり、まん延しやすくなっています。

毎日の入念な臨床観察、異常鶏の早期発見、早期通報をお願いします。



- ◇ 症状の有無にかかわらず、同一の家きん舎内において、1日の家きんの死亡率が対象期間(当日から遡って21日間)における平均の死亡率の2倍以上となっている場合
- ◇ 死亡率が2倍未満の場合であっても、まとまって死亡している、元気がない、餌食いが悪い、沈うつ等といった通常と異なる症状が認められる場合

全国一斉

長野県告示
緊急消毒


農場および家きん舎等周囲への 緊急消毒を実施してください!!

南信州地域の緊急消毒は、12月21日から随時開始されます。

消石灰を受領後7日以内に下表を参考に散布してください。

また、消石灰の散布後、散布した状況を写真撮影し、実施報告書と写真の提出をお願いします。

家きん舎周囲等への消石灰の散布方法



- ★ 家きん舎周囲と農場外縁部は、2m以上の幅で地面が白く覆われる程度に！
- ★ 散布量は、1㎡あたり0.5～1.0kg(2m幅の場合、1袋で約15m)
- ★ 消石灰は強アルカリ性のため、マスク・手袋等を着用して散布しましょう！
- ★ 野外では降雨等の影響で消毒効果を長期間維持できないため、2週間程度の間隔で散布を繰り返しましょう！