

かほだより

25-2号
H25. 5. 17


長野県伊那家畜保健衛生所
TEL: 0265-72-2782, 090-5444-0970
Fax: 0265-72-2765
E-mail: inakachiku@pref.nagano.lg.jp
住所: 伊那市西町 5764
伊那諏訪家畜産物衛生指導協会

アカバネ病ワクチン接種のおすすめ

アカバネ病はヌカカに刺されることによって感染する病気です。妊娠牛が感染すると、流産、死産あるいは子牛に奇形(関節湾曲、水頭症、体型異常)、盲目、神経症状などが現れるので、胎子(産子)が和牛や乳用後継牛の場合は大きな経済損失をもたらします。また、最近では生後感染によるものも報告されています。

アカバネ病に治療法はなく、母牛群を毎年ワクチンで免疫しておくことが大切です。ワクチンはヌカカが発生する夏前までに接種し、夏には母牛にしっかりした免疫を付けておきましょう。

蚊が出る前にワクチン接種!




IBR、BVD-MD、RS など 混合ワクチン接種のおすすめ

牛伝染性鼻気管炎 (IBR)、牛ウイルス性下痢・粘膜病 (BVD-MD)、牛RSウイルス病などは、呼吸器症状(鼻汁、肺炎等)、発熱、下痢 (MVD-MD)などを呈し、時には死に至る急性のウイルス病です。冬期に多く発生しますが、春や梅雨時などにも発生するほか、公共育成牧場で流行することがあります。当所管内でも、昨年度5戸の農場で牛RSウイルス病が発生しています。

これらの病気は導入牛が持ち込む場合が多いので、外部から牛を導入する場合はワクチン接種を確認するほか、同居牛及び導入後の導入牛にも接種することが大切です。なお、乳用牛、肉用繁殖雌牛など妊娠させる牛については、BVD-MDが不活化タイプのワクチンを御利用ください。

○伊那諏訪家畜産物衛生指導協会では、これらのワクチンを取り扱っていますので、御紹介します。特に、アカバネ病のワクチンは夏前に接種することが大切ですから、最寄りの獣医師までお早めにお申し出ください。

ワクチン	料金(円/頭)
アカバネ病	1,400
IBR等5種(BVD-MD生)	1,900
IBR等5種(BVD-MD不活化)	1,900
IBR等6種(BVD-MD不活化)	2,220



牛RSウイルス病による呼吸器症状
長野家畜保健衛生所
原図