

かほだより

R5-4号
R5. 5. 22

長野県伊那家畜保健衛生所
TEL：0265-72-2782, 090-5444-0970
Fax：0265-72-2765
E-mail：inakachiku@pref.nagano.lg.jp
所在地：伊那市西町 5764
伊那諏訪家畜産物衛生指導協会
TEL&FAX：0265-76-8086

バルク乳検査(酪農生産性向上対策事業)を実施します！


長野県では今年も生産者団体と協力して、年2回、バルク乳検査（細菌検査、牛ウイルス性下痢ウイルス（BVDV）遺伝子検査）を実施します。

この検査は乳質改善や BVDV まん延防止のファーストステップとして、伝染性乳房炎原因菌等の有無や搾乳衛生の状態を確認・評価するものです。

第1回を6月に実施します。サンプル採取の日程は、あらためて通知しますので、ご協力をお願いします。

- 黄色ブドウ球菌（SA）感染牛の確認等を行いたい方は家畜保健衛生所までご連絡ください。

採材日	地域
6月12日	諏訪地域
6月6・19・26日	上伊那地域



アカバネ病ワクチンを接種しましょう

アカバネ病ワクチンの接種時期となりました。

吸血昆虫が活動を始める前（6月頃）までにアカバネ病ワクチンの接種を済ませましょう。

具体的な接種については担当の獣医師にご相談ください。

【伊那諏訪衛指協価格：1, 632円/頭】

アカバネ病とは

原因：アカバネ病ウイルス

感染経路：媒介昆虫（ヌカカ）による吸血

症状

- ・妊娠牛が感染：**流産、死産、早産**や**先天性の奇形を伴った異常子牛**の分娩
- ・子牛が感染：後躯麻痺等による起立不能や異常興奮などの神経症状



ハエ対策を実施しましょう

気候が暖かくなりハエが発生する時期になりました。ハエは人や家畜に不快感を与えるだけでなく、様々な病原体を媒介します。発生が多くなる前にしっかり対策を行いましょう。


★対策のポイント★

①発生させない②発生を抑える③ハエを捕まえる④ハエから守る

☆具体的対策☆

①発生させない（ウジが育つ環境を減らす）

- ・早めに除糞する。
- ・畜舎の隅や残餌、汚水が溜まる場所を清掃する。
- ・風通しを良くして乾燥させる。



②発生を抑える（卵～ウジは熱と乾燥に弱い）

- ・たい肥を十分に発酵させましょう。
- ・昆虫発生抑制剤（IGR剤）を定期的（1～2週間隔）に発生源へ散布する。

③ハエを捕まえる

- ・粘着シートを設置する（地上から1m以下がよい）。
- ・殺虫剤を定期的に散布する。
（薬剤の使用方法を十分確認し、牛や牛乳へかからないよう注意）

④ハエから守る

- ・牛舎周りに防虫ネット（殺虫成分入りなら効果大）を張る。
- ・駆虫剤含有のイヤータッグを牛に装着する。