

食生活・健康意識調査の結果
(アンケート調査)

問1 普段の朝食摂取状況

性別	回 答	年齢区分	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 40-74歳 ※1	(再掲) 20-49歳 ※1	(再掲) 50歳以上 ※1	(再掲) 15歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
男性	1.ほとんど毎日食べる	割合	76.8	43.6	79.9	81.8	85.3	95.2	98.4	89.1	71.4	93.5	83.2	83.6	81.3
		標準誤差	8.6	9.3	5.5	3.3	3.3	2.5	1.1	1.6	3.6	1.5	2.0	1.9	1.9
	2.週2～3日食べない	割合	5.6	17.0	5.6	7.2	5.8	2.0	0.0	4.2	9.1	2.4	5.4	5.4	6.1
	3.週4～5日食べない	割合	0.0	6.6	3.3	1.7	2.6	1.4	0.9	1.6	3.6	1.6	2.3	2.5	2.7
	4.ほとんど食べない	割合	17.5	32.7	11.2	9.3	6.4	1.4	0.6	5.0	15.9	2.6	9.1	8.5	9.9
標準誤差		7.8	9.9	4.5	2.9	2.3	1.0	0.6	1.0	3.3	0.8	1.6	1.6	1.8	
		総数	25	39	77	99	107	95	127	347	215	329	569	544	
女性	1.ほとんど毎日食べる	割合	68.6	88.7	91.7	91.9	96.8	98.7	98.7	94.5	84.8	96.4	91.6	91.8	89.7
		標準誤差	10.6	3.7	3.3	2.7	1.5	1.1	1.1	1.1	4.0	0.9	1.6	1.7	1.9
	2.週2～3日食べない	割合	15.3	4.4	7.6	6.2	1.4	0.1	0.1	4.2	8.3	2.0	4.5	4.5	5.7
	3.週4～5日食べない	割合	6.9	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.1	1.7	0.1	0.9	0.7	1.1
	4.ほとんど食べない	割合	9.2	6.9	0.7	1.5	1.8	1.2	1.2	1.2	5.2	1.4	3.0	2.9	3.5
標準誤差		5.6	3.3	0.7	1.5	1.0	1.1	1.1	0.5	1.9	0.7	0.9	1.0	1.1	
		総数	35	49	67	113	108	102	156	365	229	366	630	595	
総数	1.ほとんど毎日食べる	割合	83.1	58.4	83.7	87.5	88.6	96.0	98.6	91.8	78.0	95.1	87.6	87.9	85.5
		標準誤差	5.8	9.1	3.9	2.2	2.2	1.3	0.7	0.9	3.3	0.8	1.5	1.5	1.4
	2.週2～3日食べない	割合	4.6	16.0	5.1	7.4	6.0	1.7	0.1	4.2	8.7	2.2	4.9	4.9	5.9
	3.週4～5日食べない	割合	1.7	6.8	1.8	0.7	1.5	0.7	0.4	0.9	2.7	0.8	1.6	1.6	1.9
	4.ほとんど食べない	割合	10.7	18.9	9.3	4.4	3.9	1.6	0.9	3.1	10.7	2.0	5.9	5.6	6.7
標準誤差		3.8	6.4	3.4	1.2	1.3	0.7	0.7	0.6	2.2	0.5	1.0	1.0	1.1	
		総数	60	88	144	212	215	197	283	712	444	695	1199	1139	

注)

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH22人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

問1 あなたはふだん朝食を食べますか。あてはまるもの1つだけ選んで○印をつけてください。

問2 食事をする時に気をつけていること。(主なものを3つまで選んで回答)

性別	回答	年齢階級	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 40-74歳 ※1	(再掲) 15歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
			割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合
男性	1.栄養のバランス	割合	22.0	18.2	15.3	29.4	26.4	21.7	26.8	23.4	22.4	22.3	23.0
		標準誤差	6.7	7.2	4.9	5.7	5.2	5.6	4.9	2.6	2.7	2.8	2.3
	2.塩分のとりすぎ	割合	6.4	22.5	14.9	25.8	38.8	49.5	40.3	38.0	31.5	33.4	32.0
		標準誤差	5.5	5.8	4.4	3.8	6.4	6.5	5.8	3.8	2.5	2.6	2.3
	3.油、脂肪のとりすぎ	割合	10.4	19.9	32.4	29.8	45.9	34.6	28.8	35.6	30.8	32.3	32.3
		標準誤差	6.2	7.1	6.2	4.1	7.4	8.4	5.5	3.3	2.8	3.1	2.7
	4.エネルギー(カロリー)のとりすぎ	割合	10.4	21.2	22.3	29.8	29.3	25.8	10.6	27.4	23.7	24.6	23.4
		標準誤差	5.9	6.0	5.5	5.5	7.5	5.5	2.5	3.4	3.2	3.4	2.4
	5.カルシウムの多い(乳製品・小魚等)食事	割合	7.5	0.0	6.2	10.6	6.0	15.9	15.6	9.4	8.7	8.7	9.1
		標準誤差	5.6	0.0	3.0	3.5	2.6	5.6	2.8	2.2	1.6	1.5	1.3
	6.野菜を多く食べる	割合	19.7	17.4	50.1	39.7	38.3	49.5	44.6	44.7	40.0	41.3	40.3
		標準誤差	7.6	7.7	5.5	5.6	6.7	6.7	5.7	3.3	2.1	2.2	2.6
	7.楽しく食べる	割合	20.8	15.7	23.7	20.8	12.8	11.3	17.3	14.3	16.6	16.4	17.0
		標準誤差	9.2	6.9	5.1	4.7	3.6	3.5	3.3	2.7	2.2	2.4	1.9
	8.家族や友人と一緒に食べる	割合	27.2	12.3	16.3	10.4	8.2	4.8	9.1	8.4	10.1	9.2	10.3
		標準誤差	9.8	7.8	4.6	2.3	2.9	2.5	2.6	1.6	1.7	1.9	1.7
	9.規則正しい食事	割合	19.7	16.9	17.0	17.2	19.7	34.8	30.1	23.6	22.1	22.0	22.6
		標準誤差	11.1	6.1	4.7	3.8	4.5	4.9	5.6	2.4	1.9	2.2	2.0
	10.特に気をつけていない	割合	38.2	46.6	27.1	24.8	25.0	15.7	24.0	22.0	24.6	24.2	27.0
		標準誤差	13.7	9.6	6.5	7.5	6.2	5.5	5.1	3.1	2.5	2.3	2.8
総数			25	38	66	87	99	77	105	300	497	472	

注)

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH22人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

性別	回答	年齢階級	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 40-74歳 ※1	(再掲) 15歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
			割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合
女性	1.栄養のバランス	割合	22.4	32.4	50.0	72.8	44.5	51.4	40.9	56.7	49.0	50.5	48.4
		標準誤差	8.1	5.0	7.2	6.0	5.5	6.8	5.4	4.0	2.9	3.0	2.5
	2.塩分のとりすぎ	割合	31.8	17.3	15.2	22.3	41.9	42.9	49.3	37.8	36.3	37.5	31.9
		標準誤差	9.9	6.6	4.6	5.1	5.8	5.2	3.9	3.3	2.2	2.2	2.1
	3.油、脂肪のとりすぎ	割合	19.9	33.3	29.3	30.2	44.3	40.0	27.6	42.1	35.5	36.7	34.2
		標準誤差	6.4	5.9	5.0	5.6	6.7	4.8	4.6	3.4	2.5	2.6	2.2
	4.エネルギー(カロリー)のとりすぎ	割合	39.3	27.8	27.0	34.1	32.0	14.1	8.0	25.2	22.2	21.5	23.8
		標準誤差	7.4	4.2	5.8	6.1	5.1	6.2	2.4	3.7	2.7	2.7	2.1
	5.カルシウムの多い(乳製品・小魚等)食事	割合	10.0	3.9	11.3	7.3	12.1	22.9	25.1	16.6	15.2	15.8	13.9
		標準誤差	7.0	2.7	4.7	2.9	3.7	5.2	3.5	3.1	2.0	2.1	1.6
	6.野菜を多く食べる	割合	33.8	44.8	50.5	51.0	55.1	55.2	53.9	51.1	50.5	51.4	51.9
		標準誤差	10.2	5.9	8.5	6.4	5.8	6.6	4.6	2.9	2.9	2.8	2.6
	7.楽しく食べる	割合	18.4	21.6	24.6	12.8	10.2	3.6	18.3	10.7	14.9	14.8	15.3
		標準誤差	6.3	5.7	4.9	3.2	3.8	2.0	4.4	2.2	1.7	1.6	1.7
	8.家族や友人と一緒に食べる	割合	14.4	9.8	24.3	13.9	11.4	5.9	9.9	6.7	11.4	10.8	12.7
		標準誤差	6.6	4.8	7.4	4.5	3.4	2.9	2.6	1.3	1.4	1.5	1.9
	9.規則正しい食事	割合	17.4	15.7	11.5	23.1	19.0	29.1	25.6	23.5	22.2	22.3	19.6
		標準誤差	7.9	4.9	4.8	4.2	5.5	7.0	4.8	2.8	1.8	2.0	2.4
	10.特に気をつけていない	割合	19.9	20.3	12.0	3.2	4.7	8.0	11.2	5.3	7.3	6.5	9.8
		標準誤差	8.0	6.4	4.8	2.5	2.4	4.5	3.9	1.9	1.5	1.5	1.7
総数			35	47	58	98	100	81	138	312	557	522	

注)

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH22人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

性別	回答	年齢階級	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 40-74歳 ※1	(再掲) 15歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
			割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合
総数	1.栄養のバランス	割合	22.2	26.2	31.9	50.9	35.4	37.2	35.0	40.2	36.3	37.1	35.7
		標準誤差	6.1	3.7	5.1	3.8	4.0	5.1	4.5	2.3	2.2	2.1	1.7
	2.塩分のとりすぎ	割合	20.1	19.6	15.0	24.1	40.3	46.1	45.5	37.9	34.0	35.5	31.9
		標準誤差	6.7	4.1	3.2	3.0	4.3	4.2	3.8	2.7	1.6	1.7	1.6
	3.油、脂肪のとりすぎ	割合	15.5	27.5	30.9	30.0	45.1	37.4	28.1	38.9	33.3	34.6	33.2
		標準誤差	4.7	5.5	4.2	3.4	4.8	5.6	3.6	2.6	2.1	2.3	1.8
	4.エネルギー(カロリー)のとりすぎ	割合	25.9	24.9	24.5	31.9	30.7	19.7	9.1	26.3	22.9	23.0	23.6
		標準誤差	4.9	3.3	3.4	5.2	5.4	4.9	2.0	3.2	2.5	2.6	1.6
	5.カルシウムが多い(乳製品・小魚等)食事	割合	8.8	2.2	8.6	8.9	9.0	19.6	21.1	13.0	12.1	12.4	11.5
		標準誤差	3.7	1.5	2.9	2.9	2.8	4.6	2.6	2.3	1.5	1.5	1.0
	6.野菜を多く食べる	割合	27.3	32.8	50.3	45.3	46.6	52.5	50.0	47.9	45.5	46.6	46.1
		標準誤差	6.4	4.4	4.7	3.9	4.4	4.7	4.1	2.3	1.6	1.6	1.8
	7.楽しく食べる	割合	19.5	19.0	24.2	16.9	11.5	7.3	17.9	12.5	15.7	15.6	16.1
		標準誤差	5.0	4.8	3.8	2.9	2.7	2.2	2.8	1.9	1.2	1.3	1.3
	8.家族や友人と一緒に食べる	割合	20.3	10.9	20.2	12.1	9.8	5.4	9.6	7.5	10.8	10.0	11.5
		標準誤差	6.4	5.4	5.1	2.3	2.6	1.7	2.0	0.9	1.3	1.4	1.3
	9.規則正しい食事	割合	18.4	16.2	14.4	20.1	19.3	31.8	27.5	23.5	22.1	22.2	21.1
		標準誤差	7.8	4.6	3.9	2.9	3.4	5.0	4.1	2.0	1.5	1.7	1.6
	10.特に気をつけていない	割合	28.3	31.7	19.9	14.1	14.9	11.7	16.6	13.6	15.6	14.9	18.4
		標準誤差	8.7	5.7	4.8	4.3	3.3	2.8	3.9	1.9	1.4	1.3	1.6
総数			60	85	124	185	199	158	243	612	1054	994	

注)

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH22人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

問2 あなたは食事をする時に気をつけていることがありますか。主なものを3つまで選んで○印をつけてください。

問2において「食塩のとり過ぎに気をつけている」と回答した人の実際の食塩摂取量(g) 20歳以上

性別	区分	人数	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	P25	P75
男性	食塩のとり過ぎを気をつけている	120	12.68	4.28	0.57	12.65	9.39	15.49
	その他	242	12.27	4.11	0.40	11.34	9.07	14.78
女性	食塩のとり過ぎを気をつけている	136	11.16	4.23	0.64	10.57	8.22	13.89
	その他	267	10.19	3.42	0.34	9.78	7.63	12.21

問2において「脂肪のとり過ぎに気をつけている」と回答した人の実際の脂肪エネルギー比率(%) 20歳以上

性別	区分	人数	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	P25	P75
男性	脂肪のとり過ぎを気をつけている	118	23.78	6.95	0.75	23.95	19.39	28.67
	その他	244	24.87	6.66	0.57	24.44	20.40	29.07
女性	脂肪のとり過ぎを気をつけている	150	25.64	7.38	0.88	24.94	20.30	30.91
	その他	253	26.73	7.11	0.49	26.70	21.87	31.72

問2において「野菜を多く食べることを気をつけている」と回答した人の実際の野菜摂取量(g) 20歳以上

性別	区分	人数	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	P25	P75
男性	「野菜を多く食べる」を気をつけている	156	364.8	177.6	17.5	345.7	253.7	452.4
	その他	206	312.1	170.7	15.5	280.2	192.1	429.3
女性	「野菜を多く食べる」を気をつけている	208	327.0	154.6	13.9	304.3	222.8	415.4
	その他	195	304.5	150.3	12.2	299.1	189.2	403.1

注)

問2において、気をつけていると回答した人と、それ以外の人に分け、それぞれをH22県の県の実際の人口構成に合わせる重み付けをして算出した値

問3 家族や友人など、2人以上で食事をする回数(最近1週間)

朝食

性別	回 答	年齢区分	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 40-74歳 ※1	(再掲) 15歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
男性	1.ほとんど毎日食べる	割合	42.9	17.1	42.8	53.7	49.7	79.3	69.4	63.5	53.7	54.4	52.2
		標準誤差	11.7	6.7	7.1	6.6	7.1	5.2	5.2	3.6	2.8	2.8	2.6
	2.週5～4回	割合	0.0	0.0	13.1	5.8	3.5	1.9	3.6	4.0	4.4	4.7	4.8
	3.週3～1回	割合	18.3	10.7	16.3	8.0	13.5	5.9	4.6	9.1	10.4	9.8	10.0
	4.ほとんどない	割合	38.8	72.2	27.8	32.5	33.2	12.9	22.4	23.4	31.5	31.1	33.0
標準誤差		8.0	7.7	6.3	6.6	6.3	4.5	4.5	2.8	2.3	2.4	2.5	
	総数		25	38	66	87	99	77	104	299	496	471	
女性	1.ほとんど毎日食べる	割合	45.7	33.3	75.7	58.4	64.8	74.9	64.9	66.1	62.7	63.8	62.6
		標準誤差	11.4	9.0	6.2	7.1	5.3	4.3	4.1	3.2	3.0	3.1	2.5
	2.週5～4回	割合	0.0	2.9	7.9	5.9	1.4	0.9	1.5	3.0	3.1	3.3	3.4
	3.週3～1回	割合	16.0	25.4	1.6	19.9	19.0	8.0	4.0	14.8	11.6	11.4	12.6
	4.ほとんどない	割合	38.3	38.4	14.8	15.8	14.8	16.2	29.6	16.1	22.6	21.5	21.4
標準誤差		10.9	7.9	4.7	4.8	4.8	3.5	3.8	2.1	2.2	2.2	2.1	
	総数		35	47	58	98	100	81	137	311	556	521	
総数	1.ほとんど毎日食べる	割合	44.4	26.7	57.4	56.4	57.3	77.0	66.7	64.8	58.4	59.3	57.4
		標準誤差	9.5	7.2	4.8	5.1	4.3	3.7	3.8	2.8	2.6	2.7	1.8
	2.週5～4回	割合	0.0	1.7	10.8	5.9	2.5	1.4	2.3	3.5	3.7	4.0	4.1
	3.週3～1回	割合	17.1	19.4	9.7	14.8	16.3	7.0	4.2	12.0	11.0	10.6	11.3
	4.ほとんどない	割合	38.5	52.2	22.0	23.0	24.0	14.6	26.7	19.8	26.9	26.1	27.2
標準誤差		6.5	6.7	4.2	3.2	4.0	3.1	3.5	2.1	1.9	2.0	1.6	
	総数		60	85	124	185	199	158	241	610	1052	992	

注)

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH22人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

昼食

性別	回 答	年齢区分	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 40-74歳 ※1	(再掲) 15歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
			割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合
男性	1.ほとんど毎日食べる	割合	74.8	42.5	37.6	29.4	41.5	54.1	59.3	43.2	46.7	44.6	44.2
		標準誤差	7.7	10.6	6.4	5.2	5.5	6.2	5.3	3.0	3.1	3.1	2.7
	2.週5～4回	割合	5.4	14.0	17.8	10.6	13.3	8.2	6.1	10.4	11.0	11.5	11.7
	3.週3～1回	割合	7.6	23.1	26.8	29.7	24.8	24.0	12.9	26.0	22.3	23.4	23.4
	4.ほとんどない	割合	12.2	20.4	17.8	30.3	20.4	13.8	21.7	20.4	19.9	20.5	20.6
標準誤差		5.7	6.8	4.8	3.8	2.9	4.5	4.3	2.0	2.2	2.2	1.9	
総数			25	38	66	87	99	77	104	299	496	471	
女性	1.ほとんど毎日食べる	割合	81.8	37.4	52.3	39.0	59.8	52.9	51.4	50.4	51.6	49.8	49.4
		標準誤差	7.5	7.3	6.2	5.7	6.5	5.8	4.5	3.1	2.6	2.9	2.5
	2.週5～4回	割合	7.1	19.1	18.9	9.7	8.2	10.3	8.6	9.3	11.6	11.9	12.4
	3.週3～1回	割合	2.5	27.7	13.8	34.0	21.1	19.5	17.8	24.8	20.5	21.6	21.9
	4.ほとんどない	割合	8.6	15.7	15.0	17.3	10.9	17.3	22.1	15.5	16.3	16.7	16.3
標準誤差		5.1	6.4	4.9	4.9	4.0	4.2	3.3	2.4	2.0	2.1	1.9	
総数			35	46	58	98	100	81	136	311	554	519	
総数	1.ほとんど毎日食べる	割合	78.5	39.5	44.2	34.9	50.7	53.5	54.6	46.8	49.3	47.3	46.8
		標準誤差	5.5	6.1	4.6	4.1	3.6	4.8	3.9	2.4	2.4	2.6	1.8
	2.週5～4回	割合	6.3	17.0	18.3	10.1	10.8	9.3	7.6	9.9	11.3	11.7	12.1
	3.週3～1回	割合	4.9	25.8	21.0	32.1	22.9	21.7	15.9	25.4	21.4	22.5	22.7
	4.ほとんどない	割合	10.2	17.7	16.5	22.9	15.6	15.6	21.9	17.9	18.0	18.5	18.5
標準誤差		4.4%	5.2%	3.7%	3.4%	2.5%	3.7%	2.8%	1.5	1.7	1.8	0.0	
総数			60	84	124	185	199	158	240	610	1050	990	

注)

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH22人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

夕食

性別	回 答	年齢区分	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 40-74歳 ※1	(再掲) 15歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
			割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合
男性	1.ほとんど毎日食べる	割合	72.0	39.0	50.2	49.4	61.5	76.9	74.8	64.8	60.7	59.8	58.9
		標準誤差	13.9	10.5	8.2	5.1	6.3	4.5	5.1	3.5	2.8	2.9	2.8
	2.週5～4回	割合	5.4	15.3	16.4	9.0	7.0	6.7	3.3	7.4	8.7	9.0	9.5
	3.週3～1回	割合	22.6	32.0	25.7	37.7	24.3	11.5	5.2	22.5	22.1	22.0	22.4
	4.ほとんどない	割合	0.0	13.7	7.7	3.9	7.3	4.8	16.8	5.3	8.5	9.1	9.1
標準誤差		0.0	5.5	3.3	2.1	2.6	2.6	3.9	1.3	1.6	1.6	1.4	
総数			25	38	66	86	99	77	105	299	496	471	
女性	1.ほとんど毎日食べる	割合	68.7	57.0	75.7	86.9	75.2	73.8	67.4	76.8	72.3	72.7	72.7
		標準誤差	10.2	8.7	6.4	4.9	5.1	3.8	3.9	2.8	2.7	2.6	2.3
	2.週5～4回	割合	11.4	22.3	14.6	4.8	10.7	3.5	4.4	5.8	9.1	8.9	10.0
	3.週3～1回	割合	17.4	13.2	8.6	6.7	8.7	13.1	7.5	9.5	9.5	8.9	9.5
	4.ほとんどない	割合	2.5	7.6	1.1	1.6	5.3	9.6	20.7	7.9	9.1	9.5	7.7
標準誤差		2.5	6.2	1.1	1.6	3.2	2.7	3.6	1.7	1.5	1.6	1.4	
総数			35	46	58	98	100	81	137	312	555	520	
総数	1.ほとんど毎日食べる	割合	70.3	49.6	61.5	70.8	68.4	75.3	70.4	70.8	66.8	66.6	65.8
		標準誤差	9.5	7.6	6.4	4.3	4.8	3.2	3.5	2.5	2.4	2.2	1.8
	2.週5～4回	割合	8.6	19.4	15.6	6.6	8.9	5.1	3.9	6.6	8.9	8.9	9.8
	3.週3～1回	割合	19.8	21.0	18.1	20.0	16.5	12.4	6.6	16.0	15.5	15.2	16.0
	4.ほとんどない	割合	1.3	10.1	4.7	2.6	6.3	7.3	19.2	6.6	8.8	9.3	8.4
標準誤差		1.4	3.9	1.8	1.3	2.1	2.0	3.2	1.1	1.2	1.3	1.0	
総数			60	84	124	184	199	158	242	611	1051	991	

注)

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH22人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

問3 あなたが家族や友人など、2人以上で食事をする回数は最近の1週間でどのくらいありましたか。食事ごとに1つだけ選んで○印をつけてください。

問4 家族や友人と食べる食事について

性別	回答	年齢区分	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 40-74歳 ※1	(再掲) 15歳以上 ※1	(再掲) 15歳以上 ※2	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
男性	1.楽しい	割合	59.3	54.7	45.5	73.9	65.0	55.3	69.7	61.3	61.4	60.6	65.8	60.7
		標準誤差	8.3	10.5	7.3	4.5	5.3	6.6	5.4	2.5	2.7	2.6	2.8	2.8
	2.どちらかといえ ば楽しい	割合	40.2	41.5	51.8	24.3	35.0	37.6	29.4	36.4	36.1	37.0	31.6	36.8
	3.どちらかといえ ば楽しくない	割合	0.6	3.8	2.6	1.0	0.0	5.1	0.9	1.9	2.0	2.0	1.9	2.1
	4.楽しくない	割合	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	2.0	0.0	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4
	総数		25	38	66	87	99	77	105	497	472	472	300	300
女性	1.楽しい	割合	77.8	83.8	73.6	76.9	68.2	62.6	75.1	73.4	73.1	73.5	69.8	73.2
		標準誤差	8.4	5.8	5.8	4.3	4.5	6.4	3.9	2.4	2.3	2.0	2.8	2.1
	2.どちらかといえ ば楽しい	割合	20.4	15.0	25.0	20.0	31.8	35.5	24.9	25.6	25.9	25.3	28.8	25.6
	3.どちらかといえ ば楽しくない	割合	1.9	0.0	0.0	1.5	0.0	2.0	0.0	0.6	0.5	0.6	1.0	0.5
	4.楽しくない	割合	0.0	1.2	1.4	1.6	0.0	0.0	0.0	0.4	0.5	0.6	0.4	0.7
	総数		35	47	58	98	100	81	138	557	522	522	312	312
総数	1.楽しい	割合	69.1	71.9	58.0	75.6	66.6	59.0	72.9	67.6	67.6	67.0	67.8	66.9
		標準誤差	6.1	6.4	4.5	3.5	3.7	5.4	3.6	2.1	2.1	1.7	2.5	1.7
	2.どちらかといえ ば楽しい	割合	29.6	25.9	39.9	21.9	33.4	36.5	26.7	30.7	30.7	31.1	30.2	31.2
	3.どちらかといえ ば楽しくない	割合	1.3	1.6	1.4	1.3	0.0	3.5	0.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.3
	4.楽しくない	割合	0.0	0.7	0.6	1.2	0.0	1.0	0.0	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5
	総数		60	85	124	185	199	158	243	1054	994	994	612	612

注)

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH22人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

問4 家族や友人と食べる食事は楽しいですか。1つだけ選んで○印をつけてください。

問4-2 家族や友人等2人以上で楽しい食事をする人の割合
朝食

性別	回答	年齢区分	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 40-74歳 ※1	(再掲) 15歳以上 ※1	(再掲) 15歳以上 ※2	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
男性	複数で楽しい食事をしている	割合	42.9	13.3	56.0	58.6	53.2	76.7	72.2	66.7	56.7	54.7	57.6	58.1
		標準誤差	11.7	6.0	8.8	6.7	6.4	5.4	5.1	5.5	3.0	2.6	2.9	1.9
	総数	25	38	66	87	99	77	104	68	496	496	496	471	471
女性	複数で楽しい食事をしている	割合	45.7	35.0	83.6	63.5	66.2	73.8	66.4	65.3	65.3	64.2	66.5	65.4
		標準誤差	11.4	9.1	4.8	6.6	5.2	4.7	4.1	5.6	2.9	2.3	2.9	2.4
	総数	35	47	58	98	100	81	137	105	556	556	556	521	521
総数	複数で楽しい食事をしている	割合	44.4	26.1	68.2	61.4	59.7	75.2	68.7	65.8	61.2	59.5	62.3	60.4
		標準誤差	9.5	6.9	5.2	4.9	4.1	4.2	3.7	4.7	2.6	1.8	2.6	1.8
	総数	60	85	124	185	199	158	241	173	1052	1052	992	992	

夕食

性別	回答	年齢区分	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 40-74歳 ※1	(再掲) 15歳以上 ※1	(再掲) 15歳以上 ※2	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
男性	複数で楽しい食事をしている	割合	76.8	50.5	66.6	57.4	68.4	78.9	77.2	72.6	67.9	67.5	67.3	66.9
		標準誤差	11.3	10.9	6.4	4.4	5.1	5.3	5.1	5.9	2.6	2.5	2.9	2.6
	総数	25	38	66	86	99	77	105	68	496	-	471	-	
女性	複数で楽しい食事をしている	割合	78.3	78.1	90.3	90.2	86.0	75.3	71.8	72.8	80.7	81.8	80.9	82.0
		標準誤差	9.6	10.1	4.1	3.8	4.2	4.1	3.3	4.7	2.7	2.1	2.5	2.1
	総数	35	46	58	98	100	81	137	104	555	-	520	-	
総数	複数で楽しい食事をしている	割合	77.6	66.7	77.1	76.1	77.2	77.1	73.9	72.7	74.6	74.6	74.4	74.5
		標準誤差	8.3	8.8	4.1	3.3	3.8	3.9	3.1	4.4	2.2	1.6	2.2	1.7
	総数	60	84	124	184	199	158	242	172	1051	-	991	-	

注)

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH22人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

問3・問4: 問3で家族や友人と一緒に食事回数が1週間のうち「ほとんど毎日」または「4～5日」と回答し、かつ、問4で家族や友人等と食べる食事が「楽しい」または「どちらかという楽しい」と回答した人

問5 食育への関心

性別	回 答	年齢区分	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 40-74歳 ※1	(再掲) 15歳以上 ※1	(再掲) 15歳以上 ※2	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
			割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合
男性	1.関心がある	割合	28.8	31.6	35.4	44.7	34.3	47.6	50.7	43.0	40.9	39.9	41.7	40.7
		標準誤差	8.5	9.0	6.4	6.2	5.4	6.4	5.0	3.6	2.6	2.5	2.8	2.6
	2.関心がない	割合	30.9	40.3	17.1	13.1	20.6	10.8	15.9	13.5	19.2	20.1	18.5	19.5
	3.どちらともいえない	割合	40.3	28.1	47.4	42.2	45.1	41.6	33.3	43.5	39.9	39.9	39.8	39.9
総数			25	38	66	87	99	77	105	300	497		472	
女性	1.関心がある	割合	51.1	36.7	59.5	74.5	65.5	65.2	61.7	66.8	61.2	60.1	61.8	60.7
		標準誤差	9.1	8.6	7.6	4.2	5.7	4.4	5.8	2.9	3.1	2.5	3.4	2.6
	2.関心がない	割合	10.3	8.4	5.1	0.0	10.5	1.7	14.2	4.3	7.9	7.1	7.9	6.9
	3.どちらともいえない	割合	38.6	54.9	35.4	25.5	24.0	33.1	24.1	29.0	30.9	32.8	30.3	32.4
総数			35	47	58	98	100	81	138	312	557		522	
総数	1.関心がある	割合	40.7	34.6	46.1	61.7	50.0	56.6	57.3	55.0	51.5	50.0	52.2	50.7
		標準誤差	7.3	6.4	6.0	3.8	4.1	4.1	4.4	2.5	2.4	1.8	2.6	1.8
	2.関心がない	割合	19.9	21.5	11.8	5.6	15.5	6.1	14.9	8.8	13.3	13.6	13.0	13.2
	3.どちらともいえない	割合	39.4	43.9	42.1	32.7	34.5	37.3	27.8	36.2	35.2	36.3	34.8	36.1
総数			60	85	124	185	199	158	243	612	1054		994	

注)

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH22人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

問5 あなたは食育に関心がありますか。1つだけ選んで○印をつけてください。

問6 食事の際の「いただきます」「ごちそうさま」のあいさつについて

性別	回 答	年齢区分	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 40-74歳 ※1	(再掲) 15歳以上 ※1	(再掲) 15歳以上 ※2	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
男性	1.必ずしている	割合	24.7	18.0	41.2	47.6	33.7	35.8	33.0	35.0	35.8	34.4	38.7	35.0
		標準誤差	11.4	8.7	8.3	5.0	5.8	8.6	6.0	3.5	3.9	2.8	5.1	2.9
	2.時々している	割合	51.3	51.9	36.1	27.4	23.4	24.7	24.0	31.6	30.2	32.1	25.3	30.9
	3.あまりしていない	割合	17.0	14.2	16.1	16.2	27.4	26.7	21.8	20.3	20.6	20.4	23.0	20.6
	4.全くしていない	割合	7.0	15.9	6.6	8.8	15.5	12.8	21.1	13.1	13.5	13.1	13.0	13.5
	総数		25	38	66	87	99	77	105	497	472	472	300	300
女性	1.必ずしている	割合	55.2	29.6	65.2	56.8	48.4	41.1	52.6	50.3	50.1	49.8	49.4	49.4
		標準誤差	10.7	8.0	7.1	5.2	5.7	6.5	4.6	3.4	3.2	2.5	4.2	2.6
	2.時々している	割合	21.5	50.9	27.0	33.2	30.6	39.3	22.0	31.3	31.9	32.6	33.6	33.3
	3.あまりしていない	割合	21.4	18.4	3.6	7.8	12.8	17.1	13.3	12.4	11.9	12.5	12.0	12.0
	4.全くしていない	割合	1.9	1.2	4.3	2.2	8.2	2.5	12.2	5.9	6.1	5.1	5.0	5.3
	総数		35	47	58	98	100	81	138	557	522	522	312	312
総数	1.必ずしている	割合	41.0	24.8	51.9	52.9	41.1	38.5	44.7	43.0	43.3	42.1	44.0	42.2
		標準誤差	7.0	7.3	6.7	3.1	4.6	6.9	4.4	3.0	3.0	1.9	4.1	1.9
	2.時々している	割合	35.4	51.3	32.0	30.7	27.0	32.2	22.8	31.5	31.1	32.3	29.5	32.1
	3.あまりしていない	割合	19.3	16.7	10.5	11.4	20.1	21.8	16.7	16.2	16.0	16.5	17.5	16.3
	4.全くしていない	割合	4.2	7.2	5.5	5.0	11.9	7.5	15.7	9.3	9.6	9.1	9.0	9.4
	総数		60	85	124	185	199	158	243	1054	994	994	612	612

注)
 ・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。
 ※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH22人口構成に合わせるための重み付けをした値。
 ※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

問6 あなたは、食事の際に「いただきます」「ごちそうさま」のあいさつをしていますか。1つだけ選んで○印をつけてください。

問7郷土食について
(1)知っている郷土食の数について

性別	回 答	年齢区分	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 40-74歳 ※1	(再掲) 15歳以上 ※1	(再掲) 15歳以上 ※2	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
			割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合
男性	1.7種類以上	割合	5.4	2.8	2.4	4.7	4.2	2.6	4.9	3.8	3.9	3.7	3.8	3.6
	2.5～6種類	割合	0.0	4.1	4.4	4.4	7.8	7.8	9.8	7.4	6.3	6.1	6.7	6.5
	3.3～4種類	割合	22.2	26.2	28.0	42.5	38.5	36.2	29.9	37.4	33.4	32.8	34.3	33.5
	4.1～2種類	割合	45.6	40.5	37.0	34.8	32.3	29.1	29.8	31.8	33.7	34.5	32.9	33.8
	5.知らない	割合	26.8	26.5	28.1	13.6	17.1	24.2	25.6	19.5	22.7	22.8	22.3	22.6
標準誤差		8.7	9.4	6.0	4.5	3.5	5.2	4.5	2.5	2.6	2.2	2.7	2.3	
女性	総数		25	38	66	87	99	77	105	300	497	497	472	472
	1.7種類以上	割合	4.2	4.4	12.4	9.8	5.9	14.3	19.1	11.3	12.3	10.7	12.8	11.1
	2.5～6種類	割合	9.8	18.3	8.3	8.1	22.3	15.4	13.9	15.6	13.9	14.2	14.1	14.5
	3.3～4種類	割合	9.5	17.1	21.9	41.8	38.4	34.7	31.8	35.4	30.7	29.7	32.1	31.0
	4.1～2種類	割合	61.3	49.6	42.4	33.1	21.4	22.5	24.8	27.4	31.8	33.8	29.8	32.0
	5.知らない	割合	15.2	10.5	15.0	7.2	12.0	13.0	10.4	10.2	11.3	11.7	11.2	11.5
標準誤差		6.2	4.1	5.2	3.3	4.9	3.6	3.2	2.4	1.6	1.7	1.8	1.7	
総数	総数		35	47	58	98	100	81	138	312	557	557	522	522
	1.7種類以上	割合	4.8	3.7	6.9	7.6	5.1	8.6	13.4	7.6	8.3	7.2	8.5	7.3
	2.5～6種類	割合	5.2	12.5	6.1	6.5	15.1	11.7	12.2	11.5	10.3	10.1	10.6	10.5
	3.3～4種類	割合	15.4	20.8	25.3	42.1	38.4	35.4	31.0	36.4	32.0	31.3	33.1	32.2
	4.1～2種類	割合	54.0	45.9	39.4	33.9	26.9	25.7	26.8	29.6	32.7	34.2	31.3	32.9
	5.知らない	割合	20.6	17.1	22.3	9.9	14.6	18.5	16.5	14.8	16.8	17.3	16.5	17.0
標準誤差		5.1	4.6	4.5	2.7	2.8	2.6	3.2	1.9	1.5	1.4	1.6	1.4	
総数		60	85	124	185	199	158	243	612	1054	1054	994	994	

注)

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH22人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

問7 あなたは、お住まいの地域の郷土料理や伝統食を何種類知っていますか。1つだけ選んで○印をつけてください。

問7-2 地域の郷土料理を作れる種類について

性別	回答	年齢区分	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 40-74歳 ※1	(再掲) 15歳以上 ※1	(再掲) 15歳以上 ※2	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
			割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合
男性	1.7種類以上	割合	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.1	0.2	0.2
	2.5～6種類	割合	0.0	1.7	0.0	0.7	1.7	0.0	2.3	0.7	1.1	1.0	1.2	1.1
	3.3～4種類	割合	0.0	0.0	1.2	8.6	2.2	12.1	13.7	8.5	6.4	5.9	6.9	6.2
	4.1～2種類	割合	18.8	11.0	18.9	12.6	21.8	23.2	20.0	18.8	18.4	18.2	18.5	18.2
	5.作ることはできない	割合	81.2	87.3	79.9	77.0	74.2	64.7	64.0	71.7	74.0	74.8	73.3	74.4
		標準誤差	8.1	8.3	6.0	5.6	6.1	5.6	4.2	3.2	2.1	2.4	2.1	2.5
		総数	25	38	66	87	99	77	105	300	497	497	472	472
女性	1.7種類以上	割合	0.0	1.5	0.0	8.6	2.8	6.8	15.4	8.0	6.9	5.5	7.3	5.8
	2.5～6種類	割合	0.0	5.9	2.7	0.0	12.4	17.1	10.3	10.0	8.2	7.6	8.7	8.1
	3.3～4種類	割合	0.0	7.0	21.4	9.8	32.2	33.2	29.0	24.4	22.4	21.2	23.9	22.6
	4.1～2種類	割合	29.6	25.3	37.5	56.9	35.9	30.6	27.4	40.5	34.4	35.1	34.7	35.5
	5.作ることはできない	割合	70.4	60.3	38.4	24.8	16.7	12.4	17.9	17.1	28.1	30.5	25.4	28.0
		標準誤差	9.0	9.7	8.2	4.5	5.2	3.4	3.9	2.7	2.4	2.5	2.6	2.5
		総数	35	47	58	98	100	81	138	312	557	557	522	522
総数	1.7種類以上	割合	0.0	0.9	0.0	5.3	1.4	3.5	9.2	4.2	3.7	2.8	3.9	3.0
	2.5～6種類	割合	0.0	4.2	1.2	0.3	7.1	8.8	7.1	5.4	4.8	4.3	5.1	4.6
	3.3～4種類	割合	0.0	4.1	10.2	9.3	17.3	22.9	22.8	16.5	14.8	13.5	15.8	14.4
	4.1～2種類	割合	24.6	19.4	27.2	37.8	28.9	27.0	24.5	29.7	26.7	26.7	27.0	26.8
	5.作ることはできない	割合	75.4	71.4	61.5	47.2	45.3	37.9	36.3	44.3	50.0	52.6	48.2	51.2
		標準誤差	6.0	7.9	4.8	3.1	4.0	3.4	3.0	2.0	1.4	1.7	1.7	1.8
		総数	60	85	124	185	199	158	243	612	1054	1054	994	994

注)

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH22人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

問7-2 あなたは、お住まいの地域の郷土料理を何種類作ることができますか。1つだけ選んで○印をつけてください。

問8 普段の食事で1日あたり「あと1皿程度、野菜を増やすこと」についてどう考えますか
(男性)

項目	年齢階級	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲)40-74歳※1	(再掲)20-49歳※1	(再掲)50歳以上※1	(再掲)15歳以上※1	(再掲)20歳以上※1	(再掲)20歳以上※2
1.生野菜サラダを1皿程度なら増やせると思う	割合	60.2	54.5	62.5	55.0	49.4	39.5	36.4	46.6	57.8	41.2	49.3	48.6	49.6
	標準誤差	11.0	9.8	5.8	6.1	5.4	6.3	4.9	3.0	4.7	3.6	3.2	3.1	2.6
2.お浸しや煮物を1皿程度なら増やせると思う	割合	40.4	33.3	32.9	41.9	36.4	33.7	41.2	38.0	36.3	37.3	37.1	36.9	36.6
	標準誤差	10.4	9.6	7.0	6.4	5.2	6.3	5.4	3.2	4.0	3.9	2.2	2.4	2.7
3.野菜が好きではないから増やせないと思う	割合	0.0	11.3	1.9	3.6	0.0	1.8	6.4	2.6	4.9	3.0	3.6	3.9	4.0
	標準誤差	0.0	5.5	1.9	2.4	0.0	1.4	3.1	1.2	1.8	1.3	1.1	1.1	1.1
4.値段が高いから増やせないと思う	割合	0.0	7.3	2.7	4.5	5.4	0.2	0.4	3.0	4.5	1.8	2.9	3.0	3.4
	標準誤差	0.0	3.8	2.2	2.0	2.2	0.3	0.3	0.8	1.5	0.7	0.7	0.8	0.9
5.自分で食事の準備をしないから増やせないと思う	割合	13.3	31.7	24.8	25.5	21.5	24.4	19.6	24.5	26.8	21.7	23.3	24.0	24.4
	標準誤差	6.9	10.3	5.8	5.9	4.0	4.7	3.8	2.8	4.4	2.8	2.5	2.4	2.4
6.外出が多いから増やせないと思う	割合	0.0	6.8	4.4	2.9	0.6	3.3	0.0	2.0	4.5	1.2	2.5	2.7	2.9
	標準誤差	0.0	4.7	2.7	1.8	0.6	1.7	0.0	0.8	1.6	0.6	0.8	0.8	0.9
7.現在、野菜を十分に食べているから増やせないと思う	割合	0.0	10.9	9.8	8.0	9.2	23.3	25.6	14.3	9.4	20.0	14.3	15.3	14.5
	標準誤差	0.0	5.7	3.9	2.7	3.8	6.2	3.6	2.0	2.0	2.3	1.6	1.7	1.8
8.あてはまるものがない	割合	6.8	4.7	2.0	2.1	6.6	4.8	2.2	4.3	2.8	4.3	3.8	3.6	3.7
	標準誤差	4.9	2.7	1.5	1.6	2.4	2.0	1.1	1.0	1.1	1.1	0.9	0.8	0.8
総数		25	39	77	99	107	95	127	347	215	329	569	544	

注)

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH22人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

問8 普段の食事で1日あたり「あと1皿程度、野菜を増やすこと」についてどう考えますか
(女性)

項目	年齢階級	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 40-74歳 ※1	(再掲) 20-49歳 ※1	(再掲) 50歳 以上※1	(再掲) 15歳 以上※1	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
1.生野菜サラダを1皿程度なら増やせると思う	割合	76.6	53.5	54.1	57.3	62.1	56.7	39.7	56.8	55.1	50.1	53.4	52.1	53.8
	標準誤差	7.5	10.4	6.2	7.6	4.9	5.2	5.5	3.4	4.5	3.2	2.6	2.8	2.7
2.お浸しや煮物を1皿程度なら増やせると思う	割合	22.7	38.7	55.4	70.7	60.7	57.8	49.3	61.1	57.0	54.5	53.7	55.5	55.5
	標準誤差	8.0	9.4	6.6	5.2	6.9	5.9	3.8	3.1	5.0	3.7	2.5	2.6	2.6
3.野菜が好きではないから増やせないと思う	割合	4.7	0.8	0.0	1.1	3.8	0.0	0.6	1.3	0.6	1.2	1.2	1.0	1.1
	標準誤差	4.7	0.9	0.0	0.8	3.1	0.0	0.5	0.9	0.4	0.8	0.5	0.5	0.6
4.値段が高いから増やせないと思う	割合	4.5	7.8	14.6	8.7	3.1	2.4	2.9	4.3	10.7	2.8	5.9	5.9	6.6
	標準誤差	4.5	3.9	4.7	2.6	3.1	1.9	2.2	1.2	2.4	1.8	1.3	1.3	1.3
5.自分で食事の準備をしないから増やせないと思う	割合	23.4	10.1	0.0	0.0	1.0	2.6	10.0	1.3	2.5	5.6	5.4	4.4	3.9
	標準誤差	9.3	4.0	0.0	0.0	0.7	2.0	2.8	0.7	1.1	1.3	0.9	0.8	0.8
6.外食が多いから増やせないと思う	割合	0.0	3.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.4	0.5	0.6
	標準誤差	0.0	2.9	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.3	0.3	0.5
7.現在、野菜を十分に食べているから増やせないと思う	割合	2.8	9.4	9.1	5.1	7.3	20.1	26.3	13.5	7.7	19.8	14.3	15.0	12.9
	標準誤差	2.8	4.3	3.7	2.2	2.6	5.5	3.9	2.3	2.0	2.7	1.9	2.0	1.5
8.あてはまるものがない	割合	3.1	17.1	3.5	3.2	2.6	1.8	6.4	2.7	6.8	4.1	5.1	5.2	5.6
	標準誤差	316.6	10.8	2.6	1.7	1.3	1.3	2.9	0.9	3.1	1.5	1.4	1.5	1.8
総数		35	49	67	113	108	102	156	365	229	366	630	595	

注)

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH22人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

問8 普段の食事で1日あたり「あと1皿程度、野菜を増やすこと」についてどう考えますか
(総数)

項目	年齢階級	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲)40-74歳※1	(再掲)20-49歳※1	(再掲)50歳以上※1	(再掲)15歳以上※1	(再掲)20歳以上※1	(再掲)20歳以上※2
1.生野菜サラダを1皿程度なら増やせると思う	割合	68.9	53.9	58.8	56.4	55.8	48.4	38.3	51.8	56.5	46.0	51.5	50.4	51.7
	標準誤差	6.6	7.3	2.9	5.3	3.7	4.1	4.3	2.3	3.1	2.6	1.9	1.9	1.9
2.お浸しや煮物を1皿程度なら増やせると思う	割合	31.0	36.5	42.7	58.4	48.6	46.2	45.9	49.6	46.4	46.6	45.7	46.6	46.0
	標準誤差	6.2	6.0	5.4	5.1	5.0	4.8	3.1	2.6	3.6	3.0	1.9	2.0	1.9
3.野菜が好きではないから増やせないと思う	割合	2.5	5.1	1.1	2.2	1.9	0.9	3.0	2.0	2.8	2.0	2.4	2.4	2.6
	標準誤差	2.5	2.5	1.1	1.1	1.6	0.7	1.3	0.7	0.9	0.7	0.6	0.6	0.6
4.値段が高いから増やせないと思う	割合	2.4	7.6	7.9	6.9	4.3	1.4	1.8	3.6	7.6	2.4	4.4	4.5	5.0
	標準誤差	2.4	3.1	2.2	1.6	1.9	1.0	1.3	0.7	1.4	1.0	0.7	0.7	79.6
5.自分で食事の準備をしないから増やせないと思う	割合	18.7	19.0	14.0	10.9	11.2	13.1	14.0	12.9	14.9	13.0	14.0	13.8	14.1
	標準誤差	5.9	4.8	3.5	2.5	2.1	2.5	2.2	1.5	2.3	1.5	1.2	1.2	1.3
6.外出が多いから増やせないと思う	割合	0.0	4.6	2.9	1.3	0.3	1.6	0.0	1.0	2.8	0.6	1.4	1.5	1.8
	標準誤差	0.0	2.4	1.6	0.8	0.3	0.8	0.0	0.4	0.8	0.3	0.4	0.4	0.5
7.現在、野菜を十分に食べているから増やせないと思う	割合	1.5	10.0	9.5	6.3	8.2	21.6	26.0	13.9	8.6	19.9	14.3	15.1	13.7
	標準誤差	1.5	3.2	2.8	1.8	2.8	4.4	2.7	1.8	1.5	2.0	1.4	1.5	1.2
8.あてはまるものがない	割合	4.8	12.0	2.7	2.7	4.6	3.2	4.6	3.5	4.7	4.2	4.5	4.4	4.7
	標準誤差	2.9	6.5	1.4	1.2	1.2	1.1	1.8	0.7	1.6	1.0	0.8	0.9	1.0
総数		60	88	144	212	215	197	283	712	444	695	1199	1139	

注)

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH22人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

問8 あなたはふだんの食事で1日あたり「あと1皿程度、野菜を増やすこと」についてどう考えますか。あてはまるものすべて選んで○印をつけてください。

問9 健康食品や栄養補助食品(サプリメント)や栄養飲料等の利用状況

性別	回答	年齢区分	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 40-74歳 ※1	(再掲) 20-49歳 ※1	(再掲) 50歳以上 ※1	(再掲) 15歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
			割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合
男性	1.利用している	割合	2.1	5.6	21.7	15.9	28.5	31.4	36.2	27.0	15.0	31.7	22.6	24.1	23.7
		標準誤差	2.2	4.0	6.0	3.9	5.1	5.4	7.1	3.2	3.1	3.6	3.0	3.0	2.2
	2.利用していないが今後使ってみたい	割合	33.3	8.2	16.3	22.4	14.0	12.1	8.6	15.9	16.4	11.7	15.2	13.9	13.5
		標準誤差	8.2	4.3	5.1	6.8	3.6	3.6	3.0	3.1	3.4	1.8	2.0	2.1	1.8
3.利用するつもりはない	割合	64.6	86.2	62.1	61.8	57.5	56.6	55.2	57.1	68.6	56.6	62.2	62.1	62.8	
	標準誤差	8.6	5.7	7.8	5.6	5.2	6.2	6.8	3.3	4.5	3.9	3.3	3.6	2.6	
総数			25	38	66	87	99	77	105	300	191	281	497	472	
女性	1.利用している	割合	16.3	40.1	34.6	33.7	46.2	45.3	42.8	42.2	35.7	44.4	39.4	40.9	40.6
		標準誤差	7.1	6.4	6.9	5.3	4.2	6.8	4.1	2.8	4.1	2.8	2.3	2.3	2.3
	2.利用していないが今後使ってみたい	割合	10.3	13.3	25.8	20.9	14.3	13.3	3.5	14.3	20.5	8.8	13.4	13.5	15.2
		標準誤差	5.7	4.8	6.0	3.7	3.4	5.8	1.4	2.4	3.0	1.9	1.5	1.6	1.8
3.利用するつもりはない	割合	73.4	46.6	39.6	45.3	39.5	41.4	53.6	43.5	43.8	46.8	47.2	45.6	44.3	
	標準誤差	8.3	6.6	7.7	4.7	4.1	5.7	4.0	3.0	3.9	2.7	2.7	2.6	2.3	
総数			35	47	58	98	100	81	136	312	203	317	555	520	
総数	1.利用している	割合	9.7	26.0	27.4	26.0	37.4	38.5	40.2	34.6	25.2	38.7	31.4	32.9	32.1
		標準誤差	4.4	4.7	3.9	3.7	3.5	3.9	4.2	2.5	2.4	2.4	2.0	1.9	1.6
	2.利用していないが今後使ってみたい	割合	21.0	11.2	20.5	21.6	14.1	12.7	5.6	15.1	18.4	10.1	14.3	13.7	14.4
		標準誤差	5.3	4.0	4.2	4.2	2.8	3.3	1.6	2.2	2.7	1.4	1.4	1.5	1.3
3.利用するつもりはない	割合	69.3	62.8	52.1	52.4	48.5	48.8	54.3	50.3	56.4	51.2	54.4	53.4	53.5	
	標準誤差	6.3	5.5	6.2	3.2	3.7	4.2	4.1	2.4	3.2	2.6	2.3	2.4	1.7	
総数			60	85	124	185	199	158	241	612	394	598	1052	992	

注)

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH22人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

問9 あなたはふだん健康食品や栄養補助食品(サプリメント)や栄養飲料等を利用していますか。1つだけ選んで○印をつけてください。

問9 「利用している」と答えた方にお聞きします。利用した理由は何ですか。

性別	回 答	年齢区分	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 40-74歳 ※1	(再掲) 20-49歳 ※1	(再掲) 50歳以上 ※1	(再掲) 15歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※1	年齢調整 値 (20歳以上) ※2	
男性	1.食事で足りない栄養を補うため	割合	0.0	0.0	0.3	0.5	0.1	0.0	0.2	18.9	33.1	13.1	18.7	18.8	0.2	
		標準誤差		0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	4.0	8.9	3.3	3.5	3.5	0.0	
	2.美容のため	割合	100.0	29.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	1.5	0.9	4.5
		標準誤差	0.0	17.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	1.1	0.9	263.2
	3.健康増進のため	割合	0.0	41.1	36.6	27.1	40.1	50.6	49.3	41.1	35.1	48.7	44.5	44.8	40.9	
		標準誤差	0.0	34.8	14.6	11.7	7.1	9.6	9.8	4.5	11.2	4.7	4.8	4.8	6.7	
	4.病気予防のため	割合	0.0	0.0	0.0	11.5	31.8	24.4	16.6	23.3	4.8	22.8	17.6	17.7	14.3	
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	10.9	9.1	9.2	6.2	5.0	4.8	3.9	3.7	3.8	3.0	
	5.老化防止のため	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	7.4	5.5	3.9	0.0	5.0	3.5	3.5	2.8	
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	4.7	3.8	1.8	0.0	2.0	1.5	1.5	1.1	
6.なんとなく	割合	0.0	29.4	20.5	11.1	5.1	11.6	2.4	7.2	16.8	5.3	8.5	8.6	13.0		
	標準誤差	0.0	17.4	12.4	7.3	3.7	7.9	2.3	2.9	7.4	2.6	2.4	2.4	3.9		
7.その他	割合	0.0	0.0	16.2	0.0	2.9	3.0	5.2	3.8	6.9	3.5	4.4	4.5	4.8		
	標準誤差	0.0	0.0	9.7	0.0	2.9	2.9	4.6	2.2	4.8	2.0	1.8	1.8	2.0		
8.未回答	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	0.0	0.0	1.8	0.0	1.7	1.2	1.2	1.0		
	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	0.0	0.0	1.8	0.0	1.7	1.2	1.2	1.0		
	総数	1	3	14	17	31	24	42	86	34	97	132	131			
女性	1.食事で足りない栄養を補うため	割合	58.0	51.2	31.3	29.1	35.9	26.2	16.9	28.9	36.0	24.4	29.1	28.5	31.5	
		標準誤差	24.5	14.3	9.7	9.8	7.7	10.7	6.9	5.5	6.8	4.2	3.9	3.9	4.0	
	2.美容のため	割合	0.0	20.3	15.5	12.1	3.4	0.0	2.4	3.8	15.5	2.2	6.7	6.9	8.7	
		標準誤差	0.0	10.0	8.8	5.8	3.2	0.0	1.8	1.6	5.1	1.3	1.8	1.9	2.4	
	3.健康増進のため	割合	11.4	10.4	34.7	28.6	35.6	28.5	38.3	32.3	25.9	34.5	31.0	31.5	29.9	
		標準誤差	11.6	7.1	11.7	6.8	8.6	8.2	6.4	5.7	6.3	4.7	4.2	4.3	3.5	
	4.病気予防のため	割合	15.3	0.0	0.0	15.7	12.7	22.0	16.7	18.2	5.9	17.7	13.7	13.6	11.1	
		標準誤差	12.2	0.0	0.0	7.9	7.3	7.0	5.1	4.4	2.9	3.6	2.5	2.5	2.3	
	5.老化防止のため	割合	0.0	0.0	0.0	7.0	10.9	16.5	8.6	12.6	2.4	11.4	8.1	8.3	7.2	
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	5.1	5.3	9.0	3.9	3.8	1.8	3.2	2.2	2.3	2.0	
6.なんとなく	割合	15.3	2.9	4.3	0.0	0.0	2.3	2.9	0.5	2.4	1.6	2.2	1.9	2.1		
	標準誤差	12.2	2.9	4.2	0.0	0.0	2.3	2.0	0.5	1.8	1.1	1.0	0.9	1.0		
7.その他	割合	0.0	15.3	14.3	7.3	1.5	4.5	9.7	3.7	11.9	6.5	8.2	8.4	8.7		
	標準誤差	0.0	8.5	7.3	5.3	1.4	4.5	5.7	2.0	3.5	3.1	2.5	2.5	2.4		
8.未回答	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	1.6	1.0	1.1	0.8		
	標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	1.3	0.8	0.9	0.6		
	総数	6	17	20	35	47	36	65	133	72	148	226	220			

性別	回 答	年齢区分	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 40-74歳 ※1	(再掲) 20-49歳 ※1	(再掲) 50歳以上 ※1	(再掲) 15歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※1	年齢調整 値 (20歳以上) ※2
総数	1.食事で足りない栄養を補うため	割合	52.0	46.7	29.3	34.7	26.0	26.4	17.0	25.0	35.1	20.2	25.5	25.1	25.1
		標準誤差	23.9	14.0	7.1	7.9	3.7	6.3	6.7	3.8	5.8	3.0	2.7	2.7	2.6
	2.美容のため	割合	10.2	21.1	8.7	9.0	2.1	0.0	1.6	2.3	11.8	1.4	4.9	4.8	6.6
		標準誤差	9.4	9.6	5.2	4.5	2.0	0.0	1.2	1.0	3.8	0.8	1.3	1.3	1.8
	3.健康増進のため	割合	10.2	13.1	35.5	28.2	37.3	37.3	42.3	35.7	28.7	39.8	35.7	36.1	35.4
		標準誤差	9.4	7.4	11.1	6.1	6.0	6.0	6.3	4.4	6.3	3.9	3.6	3.7	3.8
	4.病気予防のため	割合	13.7	0.0	0.0	14.6	20.0	22.9	16.7	20.2	5.6	19.6	15.0	15.0	12.7
		標準誤差	11.4	0.0	0.0	8.2	5.5	6.2	3.7	3.8	3.3	2.6	2.2	2.2	1.9
	5.老化防止のため	割合	0.0	0.0	0.0	5.2	8.2	12.9	7.5	9.2	1.6	9.0	6.5	6.6	5.0
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	3.7	3.5	5.8	3.1	2.6	1.2	2.1	1.5	1.5	1.1
	6.なんとなく	割合	13.7	5.2	11.4	2.9	1.9	6.0	2.7	3.1	6.8	2.9	4.4	4.2	7.5
		標準誤差	11.4	5.0	6.2	2.1	1.3	3.6	1.9	1.3	2.8	1.2	1.1	1.1	2.0
	7.その他	割合	0.0	13.9	15.1	5.4	2.0	3.9	8.1	3.7	10.4	5.4	6.9	7.0	6.8
		標準誤差	0.0	8.0	6.4	4.0	1.4	2.8	3.8	1.4	2.9	2.0	1.8	1.8	1.6
	8.未回答	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	2.8	0.7	0.0	1.7	1.1	1.1	0.9
		標準誤差	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	2.1	0.7	0.0	1.0	0.7	0.7	0.6
	総数		7	20	34	52	78	60	107	219	106	245	358	351	

注)

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH22人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

問9-2 利用した理由は何ですか。あてはまるもの1つだけ選んで○印をつけてください。(問9で「(1)利用している」と答えた人のみ回答)

問10 外食時や食品購入時における、栄養成分(エネルギー、たんぱく質、脂質、塩分等)表示の参考状況

性別	回答	年齢区分	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲)40-74歳※1	(再掲)20-49歳※1	(再掲)50歳以上※1	(再掲)15歳以上※1	(再掲)15歳以上※2	(再掲)20歳以上※1	(再掲)20歳以上※2
男性	1.いつも参考にしている	割合	0.0	0.0	4.8	9.5	4.4	5.3	7.0	6.1	5.3	5.7	5.2	4.9	5.5	5.2
	2.時々参考にしている	割合	19.3	21.6	20.9	31.6	23.2	17.6	13.7	23.3	25.0	17.8	20.9	21.2	21.0	21.3
	3.あまり参考にしていない	割合	28.3	14.0	18.0	18.1	26.9	28.7	23.1	24.5	17.1	26.1	22.4	22.0	22.0	21.6
	4.ほとんど参考にしていない	割合	52.4	64.3	56.3	40.8	45.4	48.4	56.3	46.1	52.6	50.5	51.5	51.9	51.4	51.9
	(再掲)いつも参考にしている及び時々参考にしている	割合	19.3	21.6	25.7	41.1	27.7	22.9	20.7	29.4	30.3	23.5	26.1	26.0	26.5	26.5
		標準誤差	7.9	8.7	5.5	5.5	4.6	5.1	4.1	3.1	3.8	3.0	2.4	2.2	2.4	2.3
	総数		25	39	76	99	107	95	126	347	214	328	567	567	542	542
女性	1.いつも参考にしている	割合	10.5	10.1	15.2	14.4	8.0	12.0	11.2	11.7	13.6	10.6	11.8	11.7	11.8	11.8
	2.時々参考にしている	割合	20.5	47.8	46.8	46.9	43.9	48.8	28.0	45.2	47.1	37.9	40.4	42.1	41.6	43.4
	3.あまり参考にしていない	割合	28.8	14.7	15.6	22.9	27.5	16.8	23.5	23.7	18.1	22.6	21.2	20.9	20.8	20.4
	4.ほとんど参考にしていない	割合	40.3	27.4	22.3	15.8	20.6	22.5	37.3	19.4	21.2	28.9	26.6	25.4	25.8	24.4
	(再掲)いつも参考にしている及び時々参考にしている	割合	30.9	57.9	62.0	61.3	51.9	60.8	39.2	56.9	60.8	48.5	52.2	53.7	53.4	53.7
		標準誤差	9.0	7.6	5.5	4.8	7.9	6.3	4.0	4.0	3.9	3.7	2.9	2.4	2.8	2.9
	総数		35	49	67	113	107	101	156	363	229	364	628	628	593	593
総数	1.いつも参考にしている	割合	5.6	6.0	9.4	12.3	6.2	8.8	9.4	8.9	9.4	8.4	8.6	8.3	8.8	8.5
	2.時々参考にしている	割合	19.9	37.1	32.3	40.4	33.6	33.8	22.0	34.3	35.9	28.7	31.0	31.6	31.7	32.4
	3.あまり参考にしていない	割合	28.6	14.4	17.0	20.8	27.2	22.5	23.3	24.1	17.6	24.2	21.8	21.4	21.4	21.0
	4.ほとんど参考にしていない	割合	46.0	42.5	41.4	26.5	33.0	34.9	45.2	32.7	37.2	38.8	38.6	38.7	38.1	38.2
	(再掲)いつも参考にしている及び時々参考にしている	割合	25.5	43.1	41.6	52.6	39.8	42.6	31.5	43.2	45.3	37.1	39.6	39.9	40.5	40.6
		標準誤差	6.0	6.9	3.7	4.1	5.3	3.8	2.5	2.8	3.1	2.7	2.0	1.6	2.1	1.8
	総数		60	88	143	212	214	196	282	710	443	692	1195	1195	1135	1135

注)

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH22人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

問10 あなたはふだん外食をする時や食品を購入する時に、栄養成分(エネルギー、たんぱく質、脂質、塩分等)の表示を参考にしていますか。1つだけ選んで○印をつけてください。

問10-2 栄養成分の表示を参考にしている理由。(複数回答)

性別	回 答	年齢区分	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 40-74歳 ※1	(再掲) 20-49歳 ※1	(再掲) 50歳以上 ※1	(再掲) 15歳以上 ※1	(再掲) 15歳以上 ※2	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
男性	1.エネルギーのとりすぎに注意するため	割合	47.3	44.9	65.8	71.4	68.6	29.3	25.8	56.6	64.8	41.8	53.3	51.1	53.6	51.3
		標準誤差	24.8	23.9	12.8	7.5	8.3	9.8	9.6	5.4	6.5	5.5	3.7	5.1	4.2	5.2
	2.脂肪のとりすぎに注意するため	割合	42.8	17.7	59.6	37.9	45.9	39.3	58.7	44.8	41.3	48.0	44.5	44.0	44.5	44.1
		標準誤差	24.5	14.0	15.3	7.4	8.7	14.4	7.2	6.1	8.8	6.5	5.8	4.7	5.6	4.7
	3.塩分のとりすぎに注意するため	割合	0.0	0.0	14.2	20.4	34.2	62.7	66.3	40.0	14.7	53.9	32.3	31.4	33.8	33.4
		標準誤差	0.0	0.0	9.1	6.4	8.3	12.2	9.5	6.4	4.3	6.0	5.0	3.3	5.0	3.5
	4.カルシウムの補給のため	割合	0.0	0.0	3.1	2.6	5.1	7.2	22.0	5.2	2.3	11.3	6.4	6.5	6.7	6.9
		標準誤差	0.0	0.0	3.2	2.7	3.7	4.3	10.9	1.8	1.7	4.2	2.2	2.1	2.3	2.3
	5.鉄の補給のため	割合	0.0	0.0	3.1	0.0	2.9	2.5	9.0	1.9	1.0	4.8	2.7	2.9	2.9	3.1
		標準誤差	0.0	0.0	3.2	0.0	2.8	2.5	6.1	1.1	1.0	2.4	1.2	1.3	1.3	1.4
	6.たんぱく質の補給(またはとり過ぎに注意のため)	割合	0.0	6.9	0.0	1.5	3.4	13.8	14.3	5.4	2.0	10.4	5.8	6.2	6.1	6.6
		標準誤差	0.0	7.3	0.0	1.5	3.5	9.2	6.6	2.4	1.4	3.5	2.0	2.1	2.0	2.3
	7.ビタミンの補給のため	割合	0.0	18.9	4.8	8.2	2.3	9.7	12.7	7.5	9.1	8.1	8.2	8.4	8.6	9.1
		標準誤差	0.0	14.5	4.8	4.3	2.3	6.0	7.5	2.4	4.3	3.0	2.4	2.1	2.5	3.0
8.食物繊維の補給のため	割合	0.0	0.0	10.7	12.0	11.2	6.1	17.3	10.4	9.4	11.6	10.0	9.3	10.5	9.8	
	標準誤差	0.0	0.0	7.3	8.1	6.7	4.4	7.8	3.7	4.7	3.5	2.8	2.5	2.8	2.7	
9.病気の治療のため	割合	0.0	0.0	10.8	6.6	2.0	8.0	11.5	6.2	6.7	7.1	6.6	6.2	6.9	6.6	
	標準誤差	0.0	0.0	7.4	4.4	2.0	5.9	6.1	2.4	3.3	2.9	2.0	2.0	2.1	2.1	
10.なんとなく	割合	29.6	48.2	15.8	28.9	12.5	14.2	3.1	17.9	28.2	10.0	19.8	20.2	19.3	19.6	
	標準誤差	22.7	25.2	14.2	10.3	6.1	9.1	2.4	4.8	10.8	3.9	5.8	5.1	6.2	5.2	
	総数	5	7	17	37	29	23	29	101	61	81	147	147	142	142	
女性	1.エネルギーのとりすぎに注意するため	割合	98.2	74.2	58.6	82.1	68.5	47.5	27.1	62.1	71.1	45.5	58.4	61.5	57.1	59.1
		標準誤差	1.9	11.2	9.2	4.6	6.9	7.6	6.0	3.9	4.7	4.3	3.4	3.0	3.4	3.2
	2.脂肪のとりすぎに注意するため	割合	24.2	57.3	46.4	49.3	53.4	54.5	49.5	54.3	50.1	52.3	50.4	50.0	51.3	51.6
		標準誤差	15.6	12.8	8.7	7.4	4.5	7.1	6.4	3.4	6.5	3.4	3.2	3.2	3.3	3.3
	3.塩分のとりすぎに注意するため	割合	19.4	16.8	41.1	36.1	45.9	64.3	76.0	52.1	33.4	63.8	49.1	45.6	50.0	47.3
		標準誤差	14.1	6.3	10.7	5.5	7.0	6.5	6.3	3.9	4.9	4.3	3.2	3.0	3.3	3.0
	4.カルシウムの補給のため	割合	0.0	6.7	5.4	9.3	8.4	22.9	41.5	17.1	7.2	26.0	16.9	14.9	17.5	15.8
		標準誤差	0.0	4.1	3.2	4.6	4.7	5.4	7.1	3.0	2.1	4.1	2.6	1.9	2.6	2.1
	5.鉄の補給のため	割合	0.0	3.6	10.4	17.9	12.6	11.5	24.7	14.4	11.6	16.7	13.9	12.8	14.4	13.6
		標準誤差	0.0	2.6	5.8	5.3	4.7	3.8	5.5	2.2	2.5	2.8	1.8	1.9	1.8	2.0
	6.たんぱく質の補給(またはとり過ぎに注意のため)	割合	5.9	2.1	8.4	4.3	1.2	11.6	13.5	7.4	5.4	9.5	7.6	6.8	7.7	6.9
		標準誤差	6.1	1.7	4.8	2.8	1.2	4.4	4.9	1.8	1.9	2.0	1.6	1.5	1.7	1.5
	7.ビタミンの補給のため	割合	7.8	1.5	30.5	10.2	4.3	24.8	19.9	14.8	16.0	17.5	16.6	14.9	16.9	15.4
		標準誤差	6.4	1.5	10.6	4.3	2.5	7.1	5.4	2.3	4.7	3.3	2.7	2.4	2.7	2.5
8.食物繊維の補給のため	割合	0.0	11.9	8.3	8.3	4.0	25.1	26.4	15.5	9.1	19.9	14.6	13.0	15.0	13.8	
	標準誤差	0.0	9.9	4.4	2.7	2.1	6.4	8.4	3.0	2.7	4.5	3.3	2.4	3.4	2.5	
9.病気の治療のため	割合	0.0	2.1	1.7	0.9	0.0	13.6	9.6	6.0	1.5	8.4	5.1	4.3	5.3	4.5	
	標準誤差	0.0	2.1	1.7	0.9	0.0	5.0	3.5	1.7	0.9	2.2	1.3	1.0	1.3	1.1	
10.なんとなく	割合	0.0	30.7	16.1	16.0	12.2	11.5	5.7	12.3	19.5	9.6	13.6	14.1	14.1	15.0	
	標準誤差	0.0	10.5	6.7	5.5	5.8	4.1	2.7	2.5	5.0	2.5	2.3	2.4	2.4	2.5	
	総数	12	29	38	68	55	55	66	200	135	176	323	323	311	311	

性別	回 答	年齢区分	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 40-74歳 ※1	(再掲) 20-49歳 ※1	(再掲) 50歳以上 ※1	(再掲) 15歳以上 ※1	(再掲) 15歳以上 ※2	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
			割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合
総数	1.エネルギーのとりすぎに注意するため	割合	80.2	68.2	61.1	78.6	68.5	42.8	26.8	60.2	69.0	44.4	56.8	56.3	56.0	55.2
		標準誤差	12.2	13.9	7.4	4.2	5.5	5.5	4.4	3.0	4.3	3.1	2.9	3.0	2.9	3.1
	2.脂肪のとりすぎに注意するため	割合	30.8	49.2	51.0	45.5	50.8	50.5	52.1	51.1	47.1	51.0	48.5	47.0	49.2	47.9
		標準誤差	11.8	10.4	9.1	4.9	4.8	6.7	5.3	3.6	4.6	3.4	2.9	2.8	2.9	2.9
	3.塩分のとりすぎに注意するため	割合	12.5	13.3	31.8	30.8	41.9	63.9	73.3	48.0	27.0	60.9	43.8	38.5	45.0	40.4
		標準誤差	8.3	5.1	7.4	4.5	5.4	5.5	4.6	3.4	3.7	3.4	2.5	2.2	2.7	2.3
	4.カルシウムの補給のため	割合	0.0	5.3	4.6	7.0	7.3	18.8	36.2	13.1	5.5	21.7	13.6	10.7	14.1	11.4
		標準誤差	0.0	3.3	2.4	3.2	3.3	4.7	6.0	2.4	1.5	3.4	2.1	1.4	2.2	1.5
	5.鉄の補給のため	割合	0.0	2.8	7.9	11.9	9.2	9.2	20.4	10.2	8.0	13.3	10.4	7.8	10.8	8.3
		標準誤差	0.0	2.1	3.7	3.6	3.1	3.0	4.2	1.5	1.7	2.1	1.3	1.1	1.3	1.2
	6.たんぱく質の補給(またはとり過ぎに注意のため)	割合	3.8	3.1	5.5	3.4	2.0	12.1	13.7	6.7	4.2	9.8	7.0	6.5	7.2	6.7
		標準誤差	3.9	2.0	3.3	1.9	1.4	4.9	4.1	1.6	1.4	1.8	1.5	1.3	1.6	1.4
	7.ビタミンの補給のため	割合	5.0	5.1	21.6	9.5	3.6	20.9	17.9	12.3	13.7	14.8	13.9	11.7	14.3	12.3
		標準誤差	4.2	3.2	7.8	3.0	1.8	6.0	4.2	1.8	3.2	2.6	1.9	1.6	1.9	2.0
	8.食物繊維の補給のため	割合	0.0	9.4	9.2	9.5	6.5	20.2	23.9	13.8	9.2	17.5	13.1	11.1	13.6	11.8
		標準誤差	0.0	7.3	3.8	3.0	2.8	5.5	6.7	2.4	2.0	3.7	2.4	1.7	2.5	1.8
	9.病気の治療のため	割合	0.0	1.7	4.8	2.8	0.7	12.1	10.1	6.1	3.3	8.0	5.6	5.2	5.8	5.6
		標準誤差	0.0	1.7	3.3	1.7	0.7	4.1	2.7	1.5	1.4	1.7	1.2	1.1	1.3	1.2
	10.なんとなく	割合	10.5	34.3	16.0	20.3	12.3	12.2	5.0	14.2	22.5	9.7	15.6	17.2	15.7	17.3
		標準誤差	9.1	13.1	6.2	4.1	3.9	3.7	2.2	2.0	5.0	2.0	2.6	2.8	2.6	2.9
	総数		17	36	55	105	84	78	95	301	196	257	470	470	453	453

注)

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH22人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

問10で「(1)いつも参考にしている(2)時々参考にしている」と答えた方にお聞きします。利用した理由は何ですか。(問10で「(1)いつも参考にしている」「(2)時々参考にしている」と答えた人のみ回答)

栄養成分表示を食事の適量のために参考にしてている人の割合

性別	回 答	年齢区分	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 40-74歳 ※1	(再掲) 20-49歳 ※1	(再掲) 50歳以上 ※1	(再掲) 15歳以上 ※1	(再掲) 15歳以上 ※2	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
男性	栄養成分表示を食事の適量のために参考にしてている	割合	9.1	9.7	16.9	29.3	19.0	6.7	5.3	16.6	19.6	9.8	13.9	14.2	14.2	14.5
		標準誤差	5.4	5.1	4.0	5.0	4.1	2.3	2.0	2.1	2.9	1.7	1.6	1.5	1.7	1.6
		総数	25	39	76	99	107	95	126	347	214	328	567	567	542	542
女性	栄養成分表示を食事の適量のために参考にしてている	割合	30.4	43.0	36.4	50.3	35.5	28.9	10.6	35.3	43.2	22.1	30.5	33.5	30.5	33.7
		標準誤差	9.0	7.4	6.4	5.0	6.8	5.2	2.4	3.4	3.2	3.2	2.9	2.3	2.8	2.4
		総数	35	49	67	113	107	101	156	363	229	364	628	628	593	593
総数	栄養成分表示を食事の適量のために参考にしてている	割合	20.4	29.4	25.4	41.3	27.3	18.2	8.4	26.0	31.2	16.5	22.5	23.8	22.7	24.1
		標準誤差	5.8	6.1	3.6	4.1	4.5	2.7	1.3	2.2	2.3	1.9	1.9	1.4	1.9	1.4
		総数	60	88	143	212	214	196	282	710	443	692	1195	1195	1135	1135

注)

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH22人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

問10で「(1)いつも参考にしてているまたは(2)時々参考にしてている」と回答し、かつ、問11で参考にする理由を「エネルギーのとりすぎに注意するため」と答えた人の割合

「普段、健康のために意識的に身体を動かすようにしている人」と「していない人」の運動習慣有無の比較

性別	区分	人数	平均	標準誤差
男性	普段健康のために意識的に体を動かすようにしている人	147	61.2%	5.5%
	していない人	80	11.7%	5.1%
女性	普段健康のために意識的に体を動かすようにしている人	171	45.6%	7.7%
	していない人	116	2.2%	1.0%

意識的に歩くよう心がければ歩数を増やせると思うと回答した人と、それ以外の人現在の歩行数

男性

(歩)

年齢区分	「意識的に歩くように心がければ増やせると思う」と回答した人の歩行数				その他の人の歩行数			
	総数	平均値	標準偏差	標準誤差	総数	平均値	標準偏差	標準誤差
15-19歳	12	6002	3462	938	7	6306	3891	1514
20-29歳	13	7981	4069	1416	15	7450	2697	951
30-39歳	32	9098	5063	1028	25	11543	8299	2603
40-49歳	48	8011	4469	799	29	7273	5329	1271
50-59歳	53	7372	3685	693	24	8276	4387	918
60-69歳	53	7861	3929	709	35	7355	3739	425
70歳以上	60	5739	2725	379	37	4567	2916	399
15歳以上※1	271	7457	4066	280	172	7571	5223	621
20歳以上※1	259	7563	4095	275	165	7637	5287	649

女性

(歩)

年齢区分	「意識的に歩くように心がければ増やせると思う」と回答した人の歩行数				その他の人の歩行数			
	総数	平均値	標準偏差	標準誤差	総数	平均値	標準偏差	標準誤差
15-19歳	14	8970	4561	1460	7	7806	4243	1292
20-29歳	26	5492	1961	409	12	5832	1775	598
30-39歳	35	7958	3846	722	17	8177	3331	1138
40-49歳	66	7022	2827	488	30	7962	4217	1015
50-59歳	61	6966	2945	489	27	7241	3336	796
60-69歳	62	6261	3359	494	28	6984	2797	506
70歳以上	56	5207	4193	750	47	3132	2078	343
15歳以上※1	320	6570	3588	244	168	5851	3573	373
20歳以上※1	306	6460	3507	242	161	5722	3509	392

問11 日頃の健全な食生活を実践するため、参考にしている指針等(3つまで回答)

性別	回答	年齢階級	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 40-74歳 ※1	(再掲) 15歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
			割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合
男性	1.「食事バランスガイド」	割合	5.3	2.9	12.4	19.3	12.6	18.9	23.1	23.9	15.2	15.9	15.0
		標準誤差	4.8	2.8	4.5	3.6	3.5	5.0	4.5	5.8	1.8	1.8	1.7
	2.「食生活指針」	割合	0.0	1.7	5.3	3.6	6.4	11.1	7.0	8.7	5.8	6.2	5.9
		標準誤差	0.0	1.8	2.8	2.0	2.5	4.6	2.5	3.3	1.2	1.3	1.2
	3.「日本人の食事摂取基準」	割合	0.0	3.2	2.5	2.4	7.9	3.9	8.9	12.5	4.7	5.0	4.9
		標準誤差	0.0	2.3	1.5	1.3	3.1	1.6	2.2	3.2	0.9	0.9	0.9
	4.「六つの基礎食品」	割合	0.0	10.4	9.2	7.6	5.1	4.9	6.6	3.5	6.6	7.1	7.2
		標準誤差	0.0	8.4	4.4	5.2	2.0	2.3	2.1	2.0	1.3	1.4	1.8
	5.「3色分類」	割合	1.5	4.3	10.3	11.9	4.5	8.1	7.4	8.6	7.5	7.9	7.7
		標準誤差	1.5	3.2	4.3	4.0	2.0	2.5	2.2	3.1	1.2	1.2	1.3
	6.「その他の指針」	割合	0.0	2.2	0.0	1.8	0.0	0.0	2.2	3.2	0.9	1.0	1.0
		標準誤差	0.0	2.2	0.0	1.7	0.0	0.0	1.5	2.5	0.4	0.5	0.5
	7.「特に参考にしていない」及び「わからない」	割合	93.2	78.7	84.0	73.7	77.6	73.0	69.5	68.6	76.7	75.7	76.2
		標準誤差	4.9	8.8	4.6	4.9	3.8	6.4	4.9	5.9	1.9	2.0	2.3
総数			25	39	76	98	107	94	127	81	566	541	
女性	1.「食事バランスガイド」	割合	15.6	21.3	17.6	21.3	33.7	37.3	25.8	21.7	26.0	26.6	26.2
		標準誤差	7.3	8.1	5.0	4.9	4.0	4.9	4.2	5.2	2.4	2.5	2.1
	2.「食生活指針」	割合	7.3	3.0	5.5	3.1	8.9	9.4	10.7	8.5	7.5	7.5	6.9
		標準誤差	5.1	2.8	2.9	2.7	3.1	3.3	3.2	2.9	1.5	1.6	1.2
	3.「日本人の食事摂取基準」	割合	14.0	5.6	18.6	11.7	11.9	11.8	9.9	5.2	11.8	11.7	11.7
		標準誤差	6.5	3.0	4.9	3.9	4.5	4.5	2.7	2.1	1.6	1.6	1.6
	4.「六つの基礎食品」	割合	16.6	14.4	16.0	30.0	21.4	24.9	14.6	13.7	19.7	19.8	20.1
		標準誤差	7.2	6.9	4.9	3.8	4.7	4.4	4.0	4.5	1.8	1.8	2.0
	5.「3色分類」	割合	17.9	14.9	21.4	22.4	20.9	18.1	20.6	20.2	19.9	20.0	19.8
		標準誤差	6.9	6.7	5.2	5.0	4.3	4.5	4.9	5.2	2.3	2.3	2.1
	6.「その他の指針」	割合	0.0	0.0	2.2	3.9	0.2	0.8	0.5	0.0	1.1	1.2	1.2
		標準誤差	0.0	0.0	1.6	2.1	0.2	0.8	0.5	0.0	0.4	0.4	0.5
	7.「特に参考にしていない」及び「わからない」	割合	65.4	57.8	51.6	45.9	53.7	51.9	59.3	65.3	54.5	53.9	53.4
		標準誤差	7.9	8.0	5.7	4.8	5.6	5.6	4.5	5.6	2.4	2.5	2.3
総数			35	49	67	112	108	101	157	115	629	594	

注)

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH22人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

性別	回答	年齢階級	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 40-74歳 ※1	(再掲) 15歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
			割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合
総数	1.「食事バランスガイド」	割合	10.8	13.8	14.7	20.4	23.2	28.5	24.7	22.5	20.8	21.5	20.6
		標準誤差	5.2	5.0	3.9	3.6	3.1	3.3	3.6	4.7	1.7	1.8	1.4
	2.「食生活指針」	割合	3.9	2.5	5.4	3.3	7.7	10.2	9.1	8.5	6.7	6.9	6.4
		標準誤差	2.7	1.8	2.4	2.3	2.4	3.5	2.2	2.4	1.2	1.3	0.8
	3.「日本人の食事摂取基準」	割合	7.4	4.6	9.5	7.7	9.9	8.0	9.5	7.9	8.4	8.5	8.3
		標準誤差	3.4	2.1	2.5	2.2	2.5	2.4	1.7	1.5	0.9	0.8	0.9
	4.「六つの基礎食品」	割合	8.8	12.8	12.2	20.4	13.3	15.3	11.3	9.9	13.4	13.7	13.6
		標準誤差	3.5	5.0	3.7	2.9	2.9	2.7	2.7	3.3	1.1	1.1	1.3
	5.「3色分類」	割合	10.2	10.6	15.2	17.9	12.7	13.3	15.1	16.0	14.0	14.2	13.8
		標準誤差	3.8	4.1	3.3	3.8	2.7	2.3	3.0	3.7	1.3	1.3	1.2
	6.「その他の指針」	割合	0.0	0.9	1.0	3.0	0.1	0.4	1.2	1.2	1.0	1.1	1.1
		標準誤差	0.0	0.9	0.7	1.2	0.1	0.4	0.7	0.9	0.3	0.3	0.3
	7.「特に参考にしていない」及び「わからない」	割合	78.5	66.3	69.8	57.8	65.6	62.0	63.5	66.5	65.2	64.3	64.8
		標準誤差	5.0	5.3	4.3	4.0	3.8	4.3	4.1	4.9	1.7	1.7	1.6
総数			60	88	143	210	215	195	284	196	1195	1135	

注)

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH22人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

問11あなたは、日頃の健全な食生活を実践するため、どのような指針等を参考にしていますか。3つまで選んで○印をつけてください。

問11-2 日頃の健全な食生活を実践するため、「食事バランスガイド」等の指針を参考にしている人

性別	年齢階級	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 40-74歳 ※1	(再掲) 15歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
男性	割合	6.8	21.3	16.0	26.3	22.4	27.0	30.5	31.4	23.3	24.3	23.8
	標準誤差	4.9	8.8	4.6	4.9	3.8	6.4	4.9	5.9	1.9	2.0	2.3
	総数	25	39	76	98	107	94	127	81	566	541	
女性	割合	34.6	42.2	48.4	54.1	46.3	48.1	40.7	34.7	45.5	46.1	46.6
	標準誤差	7.9	8.0	5.7	4.8	5.6	5.6	4.5	5.6	2.4	2.5	2.3
	総数	35	49	67	112	108	101	157	115	629	594	
総数	割合	21.5	33.7	30.2	42.2	34.4	38.0	36.5	33.5	34.8	35.7	35.2
	標準誤差	5.0	5.3	4.3	4.0	3.8	4.3	4.1	4.9	1.7	1.7	1.6
	総数	60	88	143	210	215	195	284	196	1195	1135	

注)

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH22人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

問11で「食事バランスガイド」、「食生活指針」、「日本人の食事摂取基準」、「六つの基礎食品」、「3色分類」、「その他の指針」を一つ以上選択した人の割合

「食事バランスガイド等、参考にしている指針」の有無別食塩摂取量(g)

性別	区分	人数	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	P25	P75
男性	ある	102	11.9	3.4	0.43	11.6	9.6	14.0
	無い	314	12.6	4.3	0.37	12.2	9.2	15.6
女性	ある	224	10.6	3.9	0.48	10.0	7.9	12.9
	無い	237	10.5	3.5	0.30	10.3	8.1	13.1

「食事バランスガイド等、参考にしている指針」の有無別カリウム摂取量(mg)

性別	区分	人数	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	P25	P75
男性	ある	102	2671	918	109	2634	2069	3052
	無い	314	2561	858	66	2523	1950	3081
女性	ある	224	2539	819	83	2407	1972	3093
	無い	237	2263	780	60	2212	1656	2785

「食事バランスガイド等、参考にしている指針」の有無別食物繊維摂取量(g)

性別	区分	人数	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	P25	P75
男性	ある	102	17.91	8.25	1.03	16.64	12.05	21.14
	無い	314	16.88	6.74	0.61	16.62	11.93	20.65
女性	ある	224	17.74	7.04	0.78	17.30	12.81	21.57
	無い	237	14.98	5.80	0.50	14.85	11.07	17.88

「食事バランスガイド等、参考にしている指針」の有無別野菜類摂取量(g)

性別	区分	人数	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	P25	P75
男性	ある	102	358.5	189.9	22.8	346.9	232.0	449.5
	無い	314	327.8	168.2	16.6	304.2	211.2	427.7
女性	ある	224	332.4	142.6	12.6	308.3	233.0	416.1
	無い	237	292.6	156.5	12.3	279.7	172.6	404.0

「食事バランスガイド等、参考にしている指針」の有無別果物(生果)摂取量(g)

性別	区分	人数	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	P25	P75
男性	ある	102	100.9	118.1	15.9	60.0	0.0	164.7
	無い	314	74.4	102.2	7.0	37.8	0.0	116.9
女性	ある	224	122.9	127.7	12.1	92.5	7.0	172.0
	無い	237	100.9	112.5	8.9	75.0	0.0	152.5

「食事バランスガイド等、参考にしている指針」の有無別脂肪エネルギー比率(%)

性別	区分	人数	平均	標準偏差	標準誤差	中央値	P25	P75
男性	ある	102	24.23	6.94	0.93	24.82	19.21	28.91
	無い	314	24.39	6.63	0.49	24.07	20.23	28.43
女性	ある	224	26.39	6.60	0.55	25.94	22.03	30.88
	無い	237	26.01	7.88	0.90	26.03	20.50	32.29

注)

問11において、健全な食生活を実践するために参考にしている指針があると回答した人と、「ない」または「分からない」と回答した人に分け、それぞれをH22県の実際の人口構成に合わせる重み付けをして算出した値。

問12 普段から健康的のための体を動かしているかどうか

性別	回 答	年齢区分	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 40-74歳 ※1	(再掲) 20-49歳 ※1	(再掲) 50歳以上 ※1	(再掲) 15歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲)20 歳以上 ※2
			割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合
男性	1.動かすようにしている	割合	52.9	19.5	53.1	48.3	55.2	70.4	69.3	58.7	42.8	65.5	55.2	55.4	53.2
		標準誤差	8.7	6.3	7.1	5.2	4.1	5.7	4.4	3.0	4.2	2.5	2.8	2.9	2.3
	2.特に何もしていない	割合	47.1	80.5	46.9	51.7	44.8	29.6	30.7	41.3	57.2	34.5	44.8	44.6	46.8
		総数	25	39	76	99	107	94	127	346	214	328	567	542	
女性	1.動かすようにしている	割合	53.2	32.2	41.0	46.2	62.2	70.4	73.4	64.2	40.7	69.7	57.9	58.2	54.7
		標準誤差	9.3	6.3	6.5	3.9	5.5	3.7	3.8	2.5	3.5	2.5	2.3	2.3	2.1
	2.特に何もしていない	割合	46.8	67.8	59.0	53.8	37.8	29.6	26.6	35.8	59.3	30.3	42.1	41.8	45.3
		総数	35	49	67	113	108	101	156	364	229	365	629	594	
総数	1.動かすようにしている	割合	53.1	27.0	47.8	47.1	58.7	70.4	71.7	61.4	41.8	67.8	56.6	56.9	53.9
		標準誤差	6.9	4.5	5.9	3.8	3.2	3.5	3.1	2.1	3.3	2.1	2.2	2.3	1.5
	2.特に何もしていない	割合	46.9	73.0	52.2	52.9	41.3	29.6	28.3	38.6	58.2	32.2	43.4	43.1	46.1
		総数	60	88	143	212	215	195	283	710	443	693	1196	1136	

注)

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH22人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

問12 あなたはふだん、健康のために意識的に体を動かすようにしていますか。

問13 ふだんの生活において1日あたり歩数を「あと1,000歩増やすこと」についての意識
(男性)

項目	年齢階級	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲)40-74歳※1	(再掲)20-49歳※1	(再掲)50歳以上※1	(再掲)15歳以上※1	(再掲)20歳以上※1	(再掲)20歳以上※2
		割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合
1.意識的に歩くように心がければ増やせると思う	割合	58.6	41.9	57.5	57.6	70.3	60.0	51.0	61.9	53.6	59.7	57.1	57.0	56.8
	標準誤差	9.3	11.3	5.1	6.0	5.2	4.7	5.3	2.5	4.5	2.9	2.4	2.4	2.6
2.家事でよく身体を動かすようにすれば増やせると思う	割合	0.6	0.0	6.7	8.8	9.5	5.6	8.0	9.0	5.8	7.7	6.4	6.8	6.6
	標準誤差	0.7	0.0	3.4	3.1	3.2	2.5	2.9	1.3	2.2	1.3	1.2	1.3	1.2
3.歩くことが好きではないから増やせないと思う	割合	0.0	0.0	2.7	1.0	2.7	5.1	6.6	3.7	1.4	4.9	3.2	3.4	3.1
	標準誤差	0.0	0.0	2.2	0.7	1.5	2.3	2.2	1.3	0.8	1.3	0.8	0.8	0.7
4.時間がないから増やせないと思う	割合	20.8	28.5	15.1	25.7	14.1	5.1	5.9	13.5	22.3	8.1	14.8	14.4	15.4
	標準誤差	5.7	11.2	3.8	4.6	3.7	2.4	2.4	1.9	4.2	1.6	2.0	2.2	2.2
5.歩く場所がないから増やせないと思う	割合	0.0	0.0	0.2	1.6	0.6	1.0	1.6	1.5	0.7	1.1	0.9	0.9	0.8
	標準誤差	0.0	0.0	0.3	1.2	0.6	1.0	1.5	0.7	0.4	0.7	0.4	0.4	0.4
6.面倒だから増やせないと思う	割合	20.5	24.4	21.7	13.8	8.6	7.7	9.9	9.1	19.5	8.8	14.0	13.6	14.2
	標準誤差	8.1	7.7	5.8	4.3	2.9	2.8	4.0	1.6	3.3	1.7	1.6	1.6	2.0
7.病気など健康上の理由から増やせないと思う	割合	0.0	0.0	1.9	1.4	4.7	8.0	22.7	6.7	1.3	12.6	7.1	7.5	6.7
	標準誤差	0.0	0.0	1.9	1.0	2.1	2.7	4.2	1.4	0.8	1.9	1.2	1.2	1.0
8.現在、十分に歩いているから増やせないと思う	割合	8.6	13.4	12.9	3.9	7.8	14.2	17.9	9.3	9.7	13.7	11.7	11.9	11.7
	標準誤差	5.0	6.3	4.4	2.1	2.4	3.6	4.1	1.8	2.1	2.2	1.5	1.5	1.6
9.あてはまるものがない	割合	3.2	10.1	4.9	4.1	2.8	3.9	9.6	4.1	5.9	5.7	5.6	5.8	5.8
	標準誤差	3.2	4.8	2.4	2.2	1.5	1.9	3.5	1.2	2.1	1.4	1.2	1.2	1.2
総数		25	39	77	99	107	95	127	347	215	329	569	544	

注)

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH22人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

(女性)

項目	年齢階級	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲)40-74歳※1	(再掲)20-49歳※1	(再掲)50歳以上※1	(再掲)15歳以上※1	(再掲)20歳以上※1	(再掲)20歳以上※2
1.意識的に歩くように心がければ増やせると思う	割合	71.5	64.6	63.8	70.8	68.6	73.6	46.8	69.7	66.6	59.9	63.0	62.6	64.4
	標準誤差	10.2	8.1	6.9	7.3	5.7	5.4	5.1	3.5	4.8	2.9	2.9	2.7	2.6
2.家事でよく身体を動かすようにすれば増やせると思う	割合	9.4	24.6	24.4	36.8	31.7	36.8	24.9	34.8	29.1	30.0	28.6	29.7	29.7
	標準誤差	5.4	6.0	4.5	6.9	4.8	4.4	4.2	3.1	3.7	3.1	2.1	2.3	2.1
3.歩くことが好きではないから増やせないと思う	割合	6.5	6.9	1.5	1.3	1.7	1.9	1.9	2.4	2.8	1.8	2.4	2.2	2.4
	標準誤差	4.9	5.5	1.5	1.0	1.0	1.8	1.3	0.9	1.7	0.8	0.9	0.8	1.0
4.時間がないから増やせないと思う	割合	10.7	0.8	16.2	10.7	14.3	2.8	6.3	9.8	10.4	7.3	8.6	8.5	8.9
	標準誤差	6.2	0.9	4.2	2.5	4.1	1.6	2.8	2.1	1.7	2.0	1.1	1.2	1.3
5.歩く場所がないから増やせないと思う	割合	0.0	0.8	0.7	1.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.9	0.0	0.3	0.4	0.4
	標準誤差	0.0	0.9	0.7	0.9	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.0	0.2	0.2	0.2
6.面倒だから増やせないと思う	割合	12.4	17.8	6.7	9.6	5.5	3.2	2.0	5.6	10.6	3.2	6.5	6.2	7.3
	標準誤差	5.0	7.8	3.1	3.2	2.0	1.6	1.4	1.5	2.4	1.0	1.3	1.2	1.5
7.病気など健康上の理由から増やせないと思う	割合	0.0	6.0	0.0	3.2	5.5	10.1	31.3	7.6	2.7	18.8	11.7	12.4	9.5
	標準誤差	0.0	5.5	0.0	1.7	2.5	4.1	3.9	1.8	1.6	2.7	1.7	1.7	1.4
8.現在、十分に歩いているから増やせないと思う	割合	6.5	7.4	11.4	6.9	8.3	6.8	10.8	7.1	8.7	9.0	8.8	8.9	8.7
	標準誤差	4.4	3.8	5.6	5.4	3.2	2.3	3.3	1.8	2.9	2.2	1.4	1.5	1.7
9.あてはまるものがない	割合	10.6	1.2	4.8	0.5	3.7	3.2	7.5	2.8	2.3	5.3	4.5	4.1	3.6
	標準誤差	8.8	1.2	2.9	0.5	1.9	1.4	2.5	0.8	1.2	1.1	0.9	0.9	0.8
総数		35	49	67	113	108	102	156	365	229	366	630	595	

注)

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH22人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

(総数)

項目	年齢階級	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲)40-74歳※1	(再掲)20-49歳※1	(再掲)50歳以上※1	(再掲)15歳以上※1	(再掲)20歳以上※1	(再掲)20歳以上※2
1.意識的に歩くように心がければ増やせると思う	割合	65.4	55.3	60.2	65.2	69.5	67.1	48.6	65.8	60.0	59.8	60.2	59.9	60.6
	標準誤差	7.3	7.4	5.1	5.4	3.8	3.8	4.6	2.2	3.9	2.3	2.0	1.9	1.9
2.家事でよく身体を動かすようにすれば増やせると思う	割合	5.3	14.6	14.5	24.8	20.6	21.8	17.8	22.0	17.2	19.8	17.9	18.7	18.1
	標準誤差	3.1	3.5	2.8	4.6	2.7	2.7	2.2	1.8	2.6	1.6	1.3	1.4	1.2
3.歩くことが好きではないから増やせないと思う	割合	3.5	4.1	2.2	1.2	2.2	3.5	3.8	3.0	2.1	3.3	2.8	2.8	2.8
	標準誤差	2.6	3.3	1.4	0.7	0.9	1.9	1.0	1.0	0.9	0.9	0.7	0.6	0.6
4.時間がないから増やせないと思う	割合	15.4	12.2	15.6	17.2	14.2	3.9	6.1	11.7	16.5	7.6	11.6	11.4	12.1
	標準誤差	4.8	4.3	3.1	2.4	2.9	1.2	2.0	1.2	2.3	1.2	1.1	1.1	1.2
5.歩く場所がないから増やせないと思う	割合	0.0	0.5	0.5	1.3	0.3	0.5	0.7	0.9	0.8	0.5	0.6	0.6	0.6
	標準誤差	0.0	0.5	0.4	0.7	0.3	0.5	0.6	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2
6.面倒だから増やせないと思う	割合	16.2	20.5	15.2	11.4	7.1	5.4	5.3	7.4	15.1	5.8	10.1	9.7	10.7
	標準誤差	4.6	6.2	3.6	3.3	1.8	1.7	1.8	1.3	2.5	1.0	1.2	1.2	1.2
7.病気など健康上の理由から増やせないと思う	割合	0.0	3.6	1.1	2.5	5.1	9.1	27.7	7.1	2.0	15.9	9.5	10.1	8.1
	標準誤差	0.0	3.3	1.1	1.1	1.5	2.6	2.8	1.2	0.9	1.6	1.0	1.1	0.8
8.現在、十分に歩いているから増やせないと思う	割合	7.5	9.9	12.2	5.6	8.1	10.4	13.7	8.2	9.3	11.2	10.2	10.4	10.2
	標準誤差	3.8	3.7	4.4	3.2	2.0	2.2	3.0	1.2	1.9	1.6	1.0	1.0	1.2
9.あてはまるものがない	割合	7.1	4.8	4.8	2.0	3.2	3.5	8.4	3.4	4.1	5.5	5.0	4.9	4.7
	標準誤差	5.1	2.5	1.8	1.0	1.4	1.1	2.3	0.8	1.3	0.9	0.8	0.8	0.7
総数		60	88	144	212	215	197	283	712	444	695	1199	1139	

注)

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH22人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

問13 あなたはふだんの生活で1日あたり歩数を「あと1,000歩増やすこと」について、どう考えますか？あてはまるものすべて選んで○印をつけてください。

問14 ここ1か月間の睡眠による休養の状況

性別	回 答	年齢区分	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上	(再掲)	(再掲)	(再掲)	(再掲)	(再掲)	(再掲)	(再掲)
			歳	歳	歳	歳	歳	歳	歳	歳	40-74歳 ※1	20-49歳 ※1	50歳以上 ※1	15歳以上 ※1	15歳以上 ※2	20歳以上 ※1
男性	1.充分とれている	割合	25.8	10.4	27.6	25.2	23.4	36.9	48.7	30.1	22.2	37.1	29.9	28.8	30.3	29.0
	2.まあまあとれている	割合	56.0	45.1	36.5	42.2	51.1	53.0	47.2	50.0	40.0	50.5	46.5	46.4	45.7	45.8
	3.あまりとれていない	割合	18.2	44.5	33.2	29.8	24.7	10.2	3.0	18.8	35.7	11.7	22.4	23.6	22.7	23.9
	4.まったくとれていない	割合	0.0	0.0	2.7	2.8	0.9	0.0	1.1	1.1	2.1	0.7	1.3	1.2	1.4	1.3
	(再掲)充分とれている・まあまあとれている	割合	81.8	55.5	64.1	67.4	74.4	89.8	95.9	80.2	62.2	87.6	76.4	75.2	76.0	74.8
		標準誤差	8.9	9.0	5.3	6.5	4.2	3.2	1.9	2.1	4.1	1.6	2.0	2.1	2.3	2.2
	総数		25	38	66	87	99	77	105	300	191	281	497	497	472	472
女性	1.充分とれている	割合	35.1	9.2	23.1	14.6	22.8	28.5	48.8	26.6	16.2	37.6	29.3	25.6	29.0	25.0
	2.まあまあとれている	割合	58.3	73.1	63.7	64.3	63.4	56.0	46.1	58.0	66.9	52.4	58.3	60.7	58.2	60.9
	3.あまりとれていない	割合	6.1	17.7	12.0	19.8	13.3	14.1	4.3	14.5	16.0	9.0	11.5	12.8	11.8	13.2
	4.まったくとれていない	割合	0.5	0.0	1.2	1.3	0.5	1.4	0.7	0.9	0.9	1.0	0.9	0.8	0.9	0.9
	(再掲)充分とれている・まあまあとれている	割合	93.4	82.3	86.8	78.9	86.2	84.6	94.9	84.6	83.1	90.1	87.6	86.3	87.3	85.9
		標準誤差	4.2	5.9	4.4	4.8	3.4	5.2	1.9	2.5	2.7	1.9	1.6	1.7	1.7	1.8
	総数		35	47	58	98	100	81	138	312	203	319	557	557	522	522
総数	1.充分とれている	割合	30.7	9.7	25.6	19.1	23.1	32.6	48.8	28.3	19.2	37.4	29.6	27.2	29.6	27.0
	2.まあまあとれている	割合	57.3	61.6	48.6	54.8	57.3	54.6	46.6	54.0	53.2	51.6	52.6	53.6	52.3	53.3
	3.あまりとれていない	割合	11.7	28.7	23.8	24.1	19.0	12.2	3.8	16.6	26.1	10.2	16.7	18.2	17.0	18.6
	4.まったくとれていない	割合	0.3	0.0	2.0	2.0	0.7	0.7	0.9	1.0	1.5	0.8	1.1	1.0	1.1	1.1
	(再掲)充分とれている・まあまあとれている	割合	88.0	71.3	74.2	73.9	80.3	87.1	95.3	82.4	72.4	88.9	82.2	80.8	81.9	80.4
		標準誤差	4.3	6.0	3.4	4.2	2.7	2.8	1.3	1.3	2.2	1.1	1.0	1.3	1.0	1.4
	総数		60	85	124	185	199	158	243	612	394	600	1054	1054	994	994

注)

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH22人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

問14 休養についてお聞きします。ここ1ヶ月あなたは睡眠で休養が十分にとれていますか。

問15 疲労の回復状況

性別	回答	年齢区分	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 40-74歳 ※1	(再掲) 20-49歳 ※1	(再掲) 50歳以上 ※1	(再掲) 15歳以上 ※1	(再掲) 15歳以上 ※2	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2	
男性	1.疲れがとれにくい	割合	29.1	25.2	45.9	50.8	39.0	31.2	33.3	38.8	42.9	33.8	37.3	37.2	38.0	37.7	
		標準誤差	8.1	9.7	6.0	5.8	5.3	6.4	6.2	6.2	3.1	4.6	3.4	2.8	2.6	3.1	2.7
	2.疲れはあまり残らない	割合	42.0	44.4	35.7	25.0	28.2	36.8	46.2	46.2	31.0	33.6	37.9	36.5	36.4	36.0	36.0
		割合	29.0	30.3	18.5	24.3	32.8	32.0	20.5	20.5	30.1	23.5	28.3	26.2	26.4	26.1	26.3
総数			25	38	66	87	99	77	105	300	191	281	497	497	472	472	
女性	1.疲れがとれにくい	割合	44.3	49.7	32.7	46.7	41.1	31.2	35.7	39.5	42.8	36.2	39.2	39.6	38.8	39.3	
		標準誤差	9.7	9.1	5.8	4.3	5.8	6.3	4.1	4.1	2.6	4.1	2.4	1.9	2.4	1.9	2.5
	2.疲れはあまり残らない	割合	34.6	17.8	33.2	22.6	35.2	34.0	41.3	41.3	31.6	25.0	38.0	32.8	31.4	32.8	31.2
		割合	21.1	32.5	34.1	30.8	23.7	34.8	23.0	23.0	28.9	32.3	25.8	28.0	29.1	28.4	29.6
総数			35	47	58	98	100	81	138	312	203	319	557	557	522	522	
総数	1.疲れがとれにくい	割合	37.2	39.7	40.0	48.4	40.0	31.2	34.7	39.2	42.8	35.1	38.3	38.4	38.4	38.5	
		標準誤差	7.0	5.9	4.2	3.3	3.0	3.9	4.1	4.1	2.0	3.0	2.2	1.8	1.7	1.9	1.8
	2.疲れはあまり残らない	割合	38.0	28.7	34.6	23.6	31.7	35.4	43.2	43.2	31.3	29.4	38.0	34.6	33.9	34.3	33.6
		割合	24.8	31.6	25.4	28.0	28.2	33.4	22.0	22.0	29.5	27.8	26.9	27.1	27.7	27.3	27.9
総数			60	85	124	185	199	158	243	612	394	600	1054	1054	994	994	

注)

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH22人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

問15 あなたは疲れがとれにくいと感じますか。1つだけ選んで○印をつけてください。

問16 ストレスの状況

性別	回 答	年齢区分	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 40-74歳 ※1	(再掲) 15歳以上 ※1	(再掲) 15歳以上 ※2	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
			割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合
男性	1.非常にストレスを感じる	割合	0.0	9.4	17.0	22.6	17.5	3.9	5.8	12.7	11.6	12.0	12.4	12.8
		標準誤差	0.0	5.1	4.8	4.2	4.6	2.2	2.3	2.3	1.7	1.6	1.8	1.6
	2.多少ストレスを感じる	割合	73.8	56.6	60.3	54.8	47.3	48.8	32.2	47.7	50.4	51.2	48.9	49.8
	3.あまりストレスを感じていない	割合	13.9	19.4	21.9	16.8	23.9	37.5	40.2	30.1	27.0	26.0	27.8	26.8
	4.ストレスをほとんど感じない	割合	12.2	14.6	0.8	5.9	11.3	9.8	21.7	9.5	11.0	10.8	10.9	10.7
	(再掲)非常にストレスを感じる 及び多少ストレスを感じる	割合	73.8	66.0	77.3	77.4	64.8	52.7	38.0	60.4	62.0	63.2	61.3	62.5
		標準誤差	11.3	10.5	5.3	5.8	5.8	7.4	5.1	3.0	3.2	2.7	2.9	2.7
	総数	25	39	76	98	107	95	127	346	567	567	542	542	
女性	1.非常にストレスを感じる	割合	20.0	13.0	13.8	14.1	21.0	12.1	12.8	14.5	14.6	14.9	14.3	14.6
		標準誤差	10.4	6.1	3.7	3.7	4.5	3.0	3.0	2.2	1.6	1.7	1.6	1.7
	2.多少ストレスを感じる	割合	56.5	58.7	67.8	72.5	59.9	60.1	45.7	62.8	58.7	60.3	58.9	60.6
	3.あまりストレスを感じていない	割合	11.7	23.7	16.3	11.7	19.0	20.9	25.7	18.9	19.7	19.1	20.2	19.6
	4.ストレスをほとんど感じない	割合	11.7	4.7	2.1	1.7	0.0	7.0	15.8	3.8	6.9	5.6	6.7	5.2
	(再掲)非常にストレスを感じる 及び多少ストレスを感じる	割合	76.5	71.6	81.6	86.6	81.0	72.1	58.6	77.3	73.3	75.3	73.1	75.2
		標準誤差	10.3	7.8	5.0	3.6	3.8	5.5	5.1	2.9	2.2	2.1	2.2	2.1
	総数	35	49	67	113	108	101	157	364	630	630	595	595	
総数	1.非常にストレスを感じる	割合	10.6	11.5	15.6	17.7	19.3	8.1	9.9	13.6	13.2	13.5	13.4	13.7
		標準誤差	5.3	5.2	3.2	2.6	2.9	1.7	1.7	1.4	1.0	1.1	1.0	1.2
	2.多少ストレスを感じる	割合	64.6	57.8	63.6	64.9	53.7	54.6	40.1	55.3	54.7	55.8	54.1	55.2
	3.あまりストレスを感じていない	割合	12.8	21.9	19.4	13.9	21.5	28.9	31.8	24.5	23.2	22.6	23.8	23.2
	4.ストレスをほとんど感じない	割合	12.0	8.7	1.4	3.5	5.6	8.3	18.3	6.6	8.9	8.2	8.7	8.0
	(再掲)非常にストレスを感じる 及び多少ストレスを感じる	割合	75.2	69.3	79.2	82.6	72.9	62.8	50.0	68.9	67.9	69.2	67.5	68.9
		標準誤差	7.6	6.5	3.4	3.8	2.9	5.1	4.0	2.4	2.3	1.7	2.2	1.7
	総数	60	88	143	211	215	196	284	710	1197	1197	1137	1137	

注)

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH22人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

問16 あなたはストレスがどのくらいあると感じていますか。1つだけ選んで○印をつけてください。

問17 あなたはストレスを解消する対処法がありますか。

性別	回 答	年齢区分	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 40-74歳 ※1	(再掲) 15歳以上 ※1	(再掲) 15歳以上 ※2	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
			割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合
男性	1.ある	割合	71.8	67.9	40.3	49.4	51.6	38.8	32.8	44.3	47.2	47.9	45.3	46.4
		標準誤差	10.3	10.7	7.0	6.1	5.0	6.3	5.3	3.9	3.6	2.7	3.6	2.8
	2.ない	割合	12.2	7.1	12.7	11.7	16.6	20.3	24.6	16.4	15.7	15.5	16.0	15.7
	3.どちらともいえない	割合	16.0	25.0	47.0	38.9	31.9	41.0	42.6	39.3	37.1	36.6	38.7	37.9
		総数	25	38	66	86	99	77	105	299	496	496	471	471
女性	1.ある	割合	44.7	64.2	51.4	57.2	56.9	51.7	42.2	54.2	52.1	53.1	52.7	53.7
		標準誤差	9.5	8.0	7.3	8.0	6.1	5.4	4.2	3.7	2.9	2.6	3.0	2.7
	2.ない	割合	14.0	8.6	12.2	6.0	12.4	10.3	28.2	11.4	14.9	13.3	14.9	13.3
	3.どちらともいえない	割合	41.3	27.2	36.4	36.8	30.7	38.0	29.6	34.4	33.0	33.5	32.4	33.1
		総数	35	47	58	98	100	81	138	312	557	496	522	471
総数	1.ある	割合	57.3	65.7	45.2	53.9	54.3	45.4	38.4	49.3	49.8	50.5	49.1	50.0
		標準誤差	7.6	6.3	5.5	6.0	4.5	3.4	3.2	3.0	2.8	1.9	2.8	1.9
	2.ない	割合	13.2	8.0	12.5	8.4	14.5	15.2	26.8	13.9	15.3	14.4	15.4	14.5
	3.どちらともいえない	割合	29.5	26.3	42.3	37.7	31.3	39.4	34.8	36.8	35.0	35.1	35.4	35.5
		総数	60	85	124	184	199	158	243	611	1053	1053	993	993

注)

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH22人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

問17 あなたはストレスを解消する対処法がありますか。1つだけ選んで○印をつけてください。

問18 血圧や糖尿病、高コレステロール、内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)の予防-改善のために普段の生活で心がけていること(複数回答)

性別	回 答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 40-74歳 ※1	(再掲) 20-49歳 ※1	(再掲) 50歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
			割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合
男性	1.たべすぎないようにしている(カロリー制限している)	割合	23.5	29.7	47.9	47.6	49.3	53.4	49.6	34.8	50.3	43.4	42.1
		標準誤差	9.4	6.0	4.9	5.3	6.2	6.1	2.8	3.4	2.9	2.4	2.6
	2.塩分を取りすぎないようにしている(減塩している)	割合	19.0	22.8	35.6	34.3	46.0	56.8	41.4	26.3	46.4	37.4	35.9
		標準誤差	7.5	5.0	5.7	5.4	7.4	6.6	3.3	3.8	3.3	2.9	2.6
	3.脂肪(あぶら分)を取りすぎないようにしている	割合	17.0	27.2	38.2	33.3	35.6	38.5	37.4	28.5	36.0	32.6	31.8
		標準誤差	7.0	5.3	5.4	4.6	6.1	5.8	2.7	3.7	3.4	2.4	2.3
	4.甘いもの(糖分)を取りすぎないようにしている	割合	9.4	17.3	28.9	23.5	40.4	41.5	33.9	19.5	35.8	28.5	26.9
		標準誤差	4.5	5.5	4.5	4.2	4.8	5.0	2.5	3.5	2.4	2.3	2.0
	5.野菜をたくさん食べるようにしている	割合	21.8	32.8	53.4	39.3	59.8	62.6	52.2	37.3	54.8	46.9	44.9
		標準誤差	7.9	7.0	7.4	5.8	6.2	5.4	3.2	4.7	2.7	2.5	2.7
	6.肉に偏らず魚を取るよう にしている	割合	8.7	17.1	22.9	27.4	38.7	48.9	33.8	17.0	39.2	29.3	27.6
		標準誤差	5.4	5.3	4.9	3.9	4.8	4.6	2.6	3.0	3.2	2.0	2.0
	7.お酒(アルコール)を飲 み過ぎないようにしている	割合	7.4	10.5	25.8	20.7	35.4	45.3	30.8	15.2	34.8	26.0	24.3
		標準誤差	4.5	3.5	5.3	4.2	5.7	6.3	2.2	2.6	2.6	1.8	2.0
	8.運動するようになっている	割合	9.9	35.1	29.4	21.1	46.1	41.1	33.7	26.7	36.7	32.2	30.6
		標準誤差	4.5	6.5	4.4	4.8	5.1	5.2	2.6	3.2	3.1	2.4	2.1
	9.睡眠で休養を充分にと るようにしている	割合	11.7	17.1	26.6	23.4	31.2	49.7	31.0	19.3	36.0	28.5	26.8
		標準誤差	5.0	5.0	4.9	3.8	5.6	5.2	2.8	3.1	3.3	2.2	2.0
	10.気分転換・ストレス解 消をするようにしている	割合	27.6	27.5	27.3	29.3	27.4	24.6	26.9	27.3	26.9	27.1	27.3
		標準誤差	7.2	5.6	5.1	4.3	6.3	3.6	2.8	3.5	2.6	2.2	2.2
	11.あてはまるものがない	割合	28.9	15.1	11.5	10.1	9.7	4.5	9.5	17.3	7.9	12.1	13.0
		標準誤差	11.0	4.0	3.7	3.0	4.9	2.3	1.9	3.6	2.1	1.8	2.2
総数			39	77	99	106	95	127	346	215	328	543	

注)

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH22人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

性別	回 答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 40-74歳 ※1	(再掲) 20-49歳 ※1	(再掲) 50歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
			割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合
女性	1.たべすぎないようにしている(カロリー制限している)	割合	52.7	42.3	59.5	54.1	59.7	55.0	59.0	51.3	56.1	54.2	53.6
		標準誤差	7.4	6.2	5.4	5.6	5.9	4.2	2.6	3.5	3.0	2.5	2.4
	2.塩分を取りすぎないようにしている(減塩している)	割合	31.2	31.0	35.5	52.0	64.3	65.2	52.7	32.8	61.7	50.2	46.8
		標準誤差	7.5	6.0	5.6	5.2	6.0	4.5	4.0	3.1	2.8	2.2	2.4
	3.脂肪(あぶら分)を取りすぎないようにしている	割合	41.9	49.9	51.9	56.1	68.0	51.3	58.9	48.7	57.2	53.8	53.2
		標準誤差	6.7	5.5	6.0	5.0	6.0	4.7	3.1	3.8	3.5	2.1	2.3
	4.甘いもの(糖分)を取りすぎないようにしている	割合	30.3	40.1	25.4	40.8	55.6	39.8	43.4	32.1	44.5	39.6	38.9
		標準誤差	9.0	6.5	4.0	4.8	4.7	4.8	2.5	4.0	2.7	2.7	2.4
	5.野菜をたくさん食べるようにしている	割合	45.5	54.2	54.8	64.8	69.4	66.7	64.5	52.0	66.9	61.0	59.5
		標準誤差	6.5	6.4	6.3	7.0	4.1	4.5	3.8	4.6	3.1	3.3	2.4
	6.肉に偏らず魚を取るようになっている	割合	22.5	22.4	35.6	38.4	51.9	47.2	43.7	27.3	46.3	38.8	36.3
		標準誤差	8.4	5.6	4.5	4.1	6.2	3.6	2.7	3.9	3.0	2.4	2.2
	7.お酒(アルコール)を飲み過ぎないようにしている	割合	29.7	15.5	13.9	20.0	21.7	13.9	18.0	18.5	17.6	17.9	18.9
		標準誤差	7.7	4.7	3.9	4.2	5.8	3.0	2.6	2.3	2.5	1.5	2.0
	8.運動するようになっている	割合	7.6	22.6	30.9	35.1	37.1	31.4	36.6	21.9	33.8	29.1	27.7
		標準誤差	3.5	6.5	4.5	6.4	6.0	4.3	3.1	3.3	3.0	2.2	2.2
	9.睡眠で休養を充分にとるようにしている	割合	21.6	28.8	31.8	36.4	38.6	45.4	36.8	27.9	41.2	35.9	34.0
		標準誤差	6.9	8.4	5.3	6.2	5.5	6.0	3.9	4.5	3.9	3.1	2.7
	10.気分転換・ストレス解消をするようになっている	割合	31.3	27.2	32.7	29.0	45.4	28.5	34.9	30.1	33.3	32.0	32.0
		標準誤差	8.2	7.5	5.6	4.5	7.0	4.3	3.0	3.8	2.6	2.1	2.6
	11.あてはまるものがない	割合	7.3	7.8	6.4	1.3	2.9	4.9	3.4	7.1	3.4	4.9	5.0
		標準誤差	3.8	3.4	2.9	1.0	2.0	1.6	1.1	1.8	1.2	1.0	1.0
総数			49	67	113	108	102	156	365	229	366	595	

注)

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH22人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

性別	回 答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 40-74歳 ※1	(再掲) 20-49歳 ※1	(再掲) 50歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
総数	1.たべすぎないようにしている(カロリー制限している)	割合	40.8	35.2	54.6	50.9	54.7	54.3	54.3	42.9	53.5	49.0	47.9
		標準誤差	6.9	4.3	3.6	3.4	3.4	4.1	2.2	2.0	2.4	1.8	1.8
	2.塩分を取りすぎないようにしている(減塩している)	割合	26.2	26.4	35.5	43.2	55.5	61.7	47.1	29.5	54.7	44.1	41.3
		標準誤差	5.8	4.3	4.6	4.3	4.0	3.4	2.6	2.4	2.1	1.8	1.7
	3.脂肪(あぶら分)を取りすぎないようにしている	割合	31.7	37.1	46.0	44.8	52.5	45.9	48.3	38.4	47.5	43.6	42.5
		標準誤差	4.7	3.0	4.2	4.0	4.4	3.7	2.3	2.6	2.9	1.8	1.6
	4.甘いもの(糖分)を取りすぎないようにしている	割合	21.8	27.3	26.9	32.2	48.3	40.5	38.7	25.7	40.5	34.3	32.9
		標準誤差	5.8	4.6	3.0	3.7	3.4	4.0	2.1	2.8	2.2	2.2	1.5
	5.野菜をたくさん食べるようにしている	割合	35.8	42.1	54.2	52.1	64.8	65.0	58.4	44.5	61.3	54.2	52.2
		標準誤差	5.3	4.6	5.2	5.3	3.9	3.8	2.8	3.8	2.4	2.4	1.8
	6.肉に偏らず魚を取るようになっている	割合	16.9	19.4	30.2	32.9	45.6	47.9	38.8	22.1	43.1	34.2	32.0
		標準誤差	5.6	3.9	3.6	3.0	4.2	2.9	2.0	2.7	2.4	1.8	1.5
	7.お酒(アルコール)を飲み過ぎないようにしている	割合	20.6	12.7	19.0	20.3	28.3	27.1	24.4	16.8	25.5	21.8	21.6
		標準誤差	5.1	2.7	3.0	3.3	4.1	2.9	1.7	1.7	1.8	1.2	1.4
	8.運動するようになっている	割合	8.5	29.6	30.3	28.2	41.4	35.5	35.2	24.3	35.2	30.6	29.1
		標準誤差	3.2	6.1	2.3	3.7	3.6	3.8	1.9	2.8	2.3	1.9	1.5
	9.睡眠で休養を充分にとるようにしている	割合	17.6	22.2	29.6	29.9	35.1	47.2	33.9	23.5	38.8	32.3	30.4
		標準誤差	4.2	4.1	4.3	4.0	3.1	4.5	2.2	3.1	2.6	2.1	1.7
	10.気分転換・ストレス解消をするようになっている	割合	29.8	27.3	30.4	29.2	36.7	26.9	30.9	28.7	30.4	29.6	29.7
		標準誤差	4.9	4.1	4.6	3.7	4.5	2.9	1.9	2.7	2.0	1.5	1.7
	11.あてはまるものがない	割合	16.1	11.9	8.6	5.7	6.2	4.7	6.4	12.3	5.5	8.3	9.0
		標準誤差	5.0	2.5	2.7	1.6	2.9	1.6	1.3	2.0	1.4	1.0	1.2
	総数	88	144	212	214	197	283	711	444	694	1138		

注)

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH22人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

問18 あなたは、高血圧や糖尿病、高コレステロール、内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)の予防-改善のために普段の生活で心がけていることがありますか。あてはまるものすべて選んで○印をつけてください。

問18 血圧や糖尿病、高コレステロール、内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)の予防-改善のために普段の生活で心がけていること(複数回答)

性別	回 答	年齢区分	40-74歳※1		20歳以上※1		20歳以上※2	
			メタボリックシンドローム該当・予備群	正常	メタボリックシンドローム該当・予備群	正常	メタボリックシンドローム該当・予備群	正常
男性	1.たべすぎないようにしている(カロリー制限している)	割合	63.8	29.1	59.6	28.6	58.3	28.0
		標準誤差	8.2	5.9	7.2	5.6	7.6	6.0
	2.塩分を取りすぎないようにしている(減塩している)	割合	36.7	27.7	37.2	23.2	34.8	22.3
		標準誤差	7.2	5.6	6.4	5.4	6.3	5.8
	3.脂肪(あぶら分)を取りすぎないようにしている	割合	39.6	25.3	37.7	25.4	36.9	25.5
		標準誤差	7.5	5.9	5.9	5.8	6.0	6.1
	4.甘いもの(糖分)を取りすぎないようにしている	割合	33.4	32.6	34.5	23.8	32.2	22.8
		標準誤差	6.9	8.1	5.6	5.3	5.3	5.5
	5.野菜をたくさん食べるようにしている	割合	54.4	51.4	55.7	40.7	54.0	38.3
		標準誤差	6.4	7.3	5.8	7.3	6.1	7.1
	6.肉に偏らず魚を取るようになっている	割合	40.5	28.0	40.2	27.4	37.9	27.0
		標準誤差	5.8	6.4	5.1	5.7	5.2	5.9
	7.お酒(アルコール)を飲み過ぎないようにしている	割合	31.8	21.3	33.3	14.5	31.0	13.7
		標準誤差	6.2	5.0	5.6	3.3	5.3	3.3
	8.運動するようになっている	割合	42.5	26.9	45.1	35.1	45.1	33.7
		標準誤差	6.5	5.8	6.0	7.8	6.0	8.2
	9.睡眠で休養を充分にとるようにしている	割合	28.4	35.5	28.8	31.5	27.1	30.1
		標準誤差	6.4	6.6	5.4	5.4	5.4	5.7
	10.気分転換・ストレス解消をするようになっている	割合	25.4	24.9	28.7	34.5	28.5	34.7
		標準誤差	6.2	4.9	5.3	6.6	5.3	6.9
	11.あてはまるものがない	割合	4.8	10.4	5.6	11.2	5.7	11.8
		標準誤差	3.2	5.2	2.8	4.0	2.7	4.5
総数			83	84	115	128	115	128

注)

値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH22人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

性別	回 答	年齢区分	40-74歳※1		20歳以上※1		20歳以上※2	
			メタボリックシンドローム該当・予備群	正常	メタボリックシンドローム該当・予備群	正常	メタボリックシンドローム該当・予備群	正常
女性	1.たべすぎないようにしている (カロリー制限している)	割合	69.4	68.8	67.4	51.6	65.1	49.0
		標準誤差	9.8	6.3	8.1	6.6	8.7	6.7
	2.塩分を取りすぎないようにしている (減塩している)	割合	62.6	56.9	61.5	52.2	58.8	49.4
		標準誤差	9.6	5.8	9.3	4.8	9.0	5.1
	3.脂肪(あぶら分)を取りすぎないようにしている	割合	75.9	66.4	71.7	56.6	71.3	54.9
		標準誤差	8.4	6.7	6.3	6.0	6.1	6.1
	4.甘いもの(糖分)を取りすぎないようにしている	割合	53.8	48.5	56.5	40.6	54.1	38.1
		標準誤差	11.3	6.2	8.1	6.5	8.3	6.5
	5.野菜をたくさん食べるようにしている	割合	68.2	66.5	71.5	61.7	67.9	58.4
		標準誤差	8.7	7.2	6.6	6.9	7.3	7.3
	6.肉に偏らず魚を取るようになっている	割合	74.6	45.0	69.5	46.1	66.8	45.1
		標準誤差	7.7	4.7	6.5	4.3	6.6	4.7
	7.お酒(アルコール)を飲み過ぎないようにしている	割合	18.7	17.1	23.1	18.6	24.1	18.9
		標準誤差	7.2	3.9	8.7	3.2	8.1	3.2
	8.運動するようになっている	割合	56.9	41.9	53.6	36.3	50.1	34.5
		標準誤差	11.0	4.8	8.5	5.2	8.8	5.1
	9.睡眠で休養を充分にとるようにしている	割合	25.8	40.0	46.1	34.9	40.8	32.7
		標準誤差	7.6	4.7	8.5	5.0	8.0	5.2
	10.気分転換・ストレス解消をするようになっている	割合	43.2	32.5	49.2	31.3	46.2	32.1
		標準誤差	14.1	5.2	9.8	4.2	10.1	4.6
	11.あてはまるものがない	割合	1.6	1.9	0.9	5.0	1.4	6.6
		標準誤差	1.6	0.9	1.0	2.0	1.4	2.9
総数			36	177	53	253	53	253

注)

値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH22人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

問19 自分の血圧に対する認識

性別	回答	年齢階級	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 75歳以上	(再掲) 40-74歳 ※1	(再掲) 20-49歳 ※1	(再掲) 50歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
男性	1.知っている	割合	31.4	74.4	88.0	87.7	95.5	91.5	87.6	91.3	68.0	91.4	80.7	78.7
		標準誤差	12.0	4.7	3.0	6.7	2.8	4.1	6.5	2.2	3.8	3.1	2.7	2.5
	2.知らない	割合	68.6	25.6	12.0	12.3	4.5	8.5	12.4	8.7	32.0	8.6	19.3	21.3
		総数	37	66	87	99	77	105	68	300	190	281	471	
女性	1.知っている	割合	63.3	76.5	86.8	93.5	96.2	92.9	91.9	92.8	76.7	94.2	87.2	85.1
		標準誤差	6.0	5.2	2.4	3.2	2.2	2.5	2.8	1.9	3.7	1.8	1.9	1.6
	2.知らない	割合	36.7	23.5	13.2	6.5	3.8	7.1	8.1	7.2	23.3	5.8	12.8	14.9
		総数	47	58	98	100	81	137	104	312	203	318	521	
総数	1.知っている	割合	50.4	75.3	87.3	90.6	95.8	92.3	90.3	92.1	72.3	92.9	84.1	81.9
		標準誤差	6.0	3.7	2.2	3.2	1.9	1.8	2.0	1.7	3.2	1.6	1.8	1.5
	2.知らない	割合	49.6	24.7	12.7	9.4	4.2	7.7	9.7	7.9	27.7	7.1	15.9	18.1
		総数	84	124	185	199	158	242	172	612	393	599	992	

注)

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH22人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

問19 血圧についてお聞きします。あなたは自分の血圧がどのくらいか知っていますか。1つだけ選んで○印をつけてください。

問19-2 自分の血圧を知っていると答えた人が思う、自分の血圧の状態

性別	回答	年齢階級	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 75歳以上	(再掲)40- 74歳※1	(再掲)20- 49歳※1	(再掲)50歳 以上※1	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
男性	1.正常範囲	割合	72.2	84.0	78.3	69.6	59.6	51.8	47.5	65.9	79.4	58.5	66.6	69.2
		標準誤差	7.9	5.8	5.7	4.4	8.5	4.9	6.1	4.3	3.1	3.4	3.0	2.7
	2.高血圧	割合	15.7	10.8	15.4	30.4	30.0	40.5	42.9	28.3	13.8	35.0	26.8	24.1
		標準誤差	9.7	5.3	2.9	4.4	7.5	6.1	6.4	3.6	3.1	3.3	2.7	2.4
	3.低血圧	割合	8.8	5.2	5.2	0.0	10.4	6.6	7.5	5.7	6.1	6.0	6.0	5.8
		標準誤差	8.9	2.8	4.7	0.0	4.9	1.9	3.2	3.0	2.4	2.1	1.9	1.6
4.わからない	割合	3.3	0.0	1.1	0.0	0.0	1.2	2.0	0.2	0.7	0.5	0.6	0.9	
総数			13	47	74	91	74	98	62	275	134	263	397	
女性	1.正常範囲	割合	57.1	82.4	73.8	66.6	59.4	54.0	49.5	66.7	72.9	59.4	64.2	65.8
		標準誤差	5.6	7.8	7.0	5.3	6.5	4.1	7.8	3.0	4.1	3.1	2.6	2.4
	2.高血圧	割合	0.0	0.0	4.3	22.9	35.7	37.4	42.2	22.0	1.6	32.6	21.7	17.0
		標準誤差	0.0	0.0	1.4	3.3	5.7	3.5	6.9	3.0	1.0	3.4	2.8	1.4
	3.低血圧	割合	42.9	17.6	21.9	10.5	5.0	6.0	4.8	11.3	25.5	6.6	13.3	16.8
		標準誤差	5.6	7.8	7.2	4.0	2.2	2.1	1.9	2.1	4.3	1.6	1.6	2.1
4.わからない	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	3.5	0.0	0.0	1.3	0.9	0.4	
総数			28	42	85	92	77	127	96	285	155	296	451	
総数	1.正常範囲	割合	60.9	83.3	75.7	68.1	59.5	53.1	48.8	66.3	76.0	59.0	65.3	67.5
		標準誤差	5.2	4.4	5.9	3.6	5.1	3.1	6.8	2.9	2.9	2.5	2.3	1.8
	2.高血圧	割合	3.9	5.9	9.1	26.5	32.9	38.6	42.4	25.1	7.4	33.7	24.0	20.6
		標準誤差	3.2	2.8	1.1	2.4	5.4	2.9	5.7	2.8	1.5	2.8	2.3	1.4
	3.低血圧	割合	34.3	10.8	14.7	5.4	7.6	6.2	5.8	8.5	16.2	6.3	10.0	11.3
		標準誤差	5.4	3.5	6.2	1.8	2.1	1.9	2.0	1.9	3.1	1.1	1.4	1.3
4.わからない	割合	0.8	0.0	0.5	0.0	0.0	2.0	2.9	0.1	0.4	1.0	0.7	0.7	
総数			41	89	159	183	151	225	158	560	289	559	848	

注)

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH22人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

問19-2あなたは自分の血圧はどのような状態だと思っていますか。1つだけ選んで○印をつけてください。(問19-1で「(1)知っている」と答えた人のみ回答)

自分の血圧を正常血圧または低血圧と認識している人の実際の血圧の状態

性別	自分が認識している血圧	実際の血圧	年齢階級	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲)40-74歳※1	(再掲)20歳以上※1	(再掲)20歳以上※2	
				割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合
男性	正常血圧及び低血圧	至適血圧・正常血圧	割合	56.9	92.7	41.9	23.0	13.8	33.0	23.7	46.5	48.2	
			標準誤差	27.2	5.3	7.8	13.7	7.0	9.9	6.0	7.4	7.7	
	正常高値	正常高値	割合	13.8	6.4	26.3	32.3	39.6	18.4	31.0	22.5	21.8	
			標準誤差	14.2	5.1	7.7	12.4	14.0	12.0	6.5	4.6	4.6	
	高血圧	高血圧	割合	29.3	0.9	31.7	44.7	46.6	48.6	45.3	31.0	30.0	
			標準誤差	25.3	1.0	7.7	13.1	15.8	8.2	7.3	6.1	6.0	
	総数				4	12	22	23	27	23	82	111	
	女性	正常血圧及び低血圧	至適血圧・正常血圧	割合	97.9	94.9	74.3	70.0	50.6	59.0	67.4	72.7	76.0
				標準誤差	2.1	5.4	10.5	11.2	8.5	13.4	4.7	3.8	3.5
		正常高値	正常高値	割合	2.1	5.1	17.4	15.8	29.6	24.0	19.3	16.7	14.7
標準誤差				2.1	5.4	6.6	8.7	8.0	11.8	3.8	3.4	3.1	
高血圧		高血圧	割合	0.0	0.0	8.3	14.2	19.8	17.0	13.4	10.6	9.3	
			標準誤差	-	-	5.9	10.6	9.7	9.6	4.4	3.0	2.8	
総数				14	14	52	30	33	22	123	165		
総数		正常血圧及び低血圧	至適血圧・正常血圧	割合	86.2	93.4	62.2	50.4	33.6	46.0	48.7	60.6	63.2
				標準誤差	9.2	3.7	6.8	8.5	8.9	6.9	3.5	3.8	3.9
		正常高値	正常高値	割合	5.4	6.0	20.8	22.6	34.2	21.2	24.3	19.4	18.0
	標準誤差			4.3	3.6	4.5	7.0	9.5	7.8	3.8	2.8	2.7	
	高血圧	高血圧	割合	8.3	0.6	17.1	26.9	32.1	32.8	27.0	20.0	18.8	
			標準誤差	8.2	0.7	5.1	8.4	11.1	8.7	3.7	3.0	3.0	
	総数				18	26	74	53	60	45	205	276	

注)

値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH22人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

問19-1で自分の血圧を「(1)知っている」と回答し、問19-2で自分が考える血圧の範囲を正常または低血圧と回答した人を対象としている。(降圧剤服用者を除く)

問20 あなたはこの1か月間に自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか。

ア. 家庭

性別	回 答	年齢区分	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上	(再掲) 40-74歳 ※1	(再掲) 20-49歳 ※1	(再掲) 50歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
			歳	歳	歳	歳	歳						
男性	1.ほぼ毎日	割合	24.4	10.0	12.3	12.2	5.6	6.4	9.9	14.5	8.0	10.9	11.6
		標準誤差	8.7	3.9	3.2	3.1	2.4	2.3	2.0	2.4	1.8	1.7	1.8
	2.週に数回程度	割合	6.2	2.3	0.0	2.2	0.6	4.6	1.9	2.5	2.6	2.6	2.6
	3.週に1回程度	割合	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	3.1	0.1	0.6	1.2	0.9	0.8
	4.月に1回程度	割合	4.3	0.6	0.0	1.1	3.0	0.8	1.2	1.3	1.6	1.5	1.6
	5.全くなかった	割合	65.1	86.2	87.3	84.6	90.8	85.2	86.8	81.1	86.7	84.2	83.4
		標準誤差	9.0	4.6	3.2	3.4	3.0	3.5	2.1	3.3	2.2	2.3	1.9
総数			39	77	98	107	94	126	344	214	327	541	
女性	1.ほぼ毎日	割合	21.7	15.7	11.5	11.0	15.6	6.0	12.0	15.7	10.1	12.3	13.4
		標準誤差	6.1	4.4	3.0	3.1	4.3	1.8	2.0	2.8	1.7	1.6	1.6
	2.週に数回程度	割合	12.7	7.2	3.7	5.5	1.8	3.8	3.3	7.4	3.7	5.2	5.7
	3.週に1回程度	割合	7.9	3.5	1.7	5.4	1.7	2.3	2.4	3.9	2.9	3.3	3.7
	4.月に1回程度	割合	0.0	4.0	2.0	0.6	3.5	0.3	1.8	2.2	1.3	1.7	1.7
	5.全くなかった	割合	57.7	69.7	81.1	77.5	77.4	87.6	80.5	70.8	82.0	77.6	75.4
		標準誤差	10.1	5.4	4.0	4.0	4.6	3.3	2.5	4.0	2.6	2.6	2.2
総数			49	66	113	107	102	155	363	228	364	592	
総数	1.ほぼ毎日	割合	22.8	12.5	11.8	11.6	10.8	6.2	11.0	15.1	9.1	11.6	12.5
		標準誤差	4.3	3.1	2.3	2.4	2.8	1.6	1.7	1.9	1.5	1.3	1.2
	2.週に数回程度	割合	10.1	4.4	2.1	3.8	1.2	4.1	2.6	4.9	3.2	3.9	4.2
	3.週に1回程度	割合	4.7	2.1	1.2	2.7	0.9	2.6	1.3	2.2	2.1	2.1	2.3
	4.月に1回程度	割合	1.7	2.1	1.1	0.9	3.3	0.5	1.5	1.7	1.4	1.6	1.7
	5.全くなかった	割合	60.7	79.0	83.7	81.1	83.8	86.6	83.6	76.1	84.2	80.8	79.4
		標準誤差	5.7	4.5	3.0	3.1	3.6	2.4	2.1	2.5	2.1	1.9	1.5
総数			88	143	211	214	196	281	707	442	691	1133	

注)

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH22人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

イ. 職場

性別	回 答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 40-74歳 ※1	(再掲) 20-49歳 ※1	(再掲) 50歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
男性	1.ほぼ毎日	割合	52.5	38.6	27.7	29.3	10.3	3.5	19.8	38.3	13.4	24.5	26.7
		標準誤差	9.7	6.8	4.9	4.3	3.8	1.8	2.3	4.3	1.9	2.8	2.3
	2.週に数回程度	割合	4.6	18.3	10.6	14.1	12.0	0.0	10.6	12.0	8.1	9.8	10.1
	3.週に1回程度	割合	0.0	8.5	4.1	7.6	3.6	2.3	4.4	4.8	4.3	4.5	4.5
	4.月に1回程度	割合	1.2	4.2	7.0	4.6	1.8	0.0	3.8	4.5	1.9	3.1	3.1
	5.全くなかった	割合	31.6	28.0	42.9	39.8	40.2	32.2	40.1	34.2	37.1	35.8	35.6
		標準誤差	8.8	7.9	5.9	4.9	6.6	5.0	3.3	4.4	3.3	2.5	2.7
	6.行かなかった	割合	10.0	2.5	7.7	4.6	32.1	62.0	21.3	6.3	35.2	22.3	19.9
総数			39	77	98	107	94	126	344	214	327	541	
女性	1.ほぼ毎日	割合	21.1	16.9	2.2	6.7	3.8	0.0	3.7	12.5	2.8	6.7	8.4
		標準誤差	7.4	6.1	1.3	2.6	2.1	0.0	1.2	3.5	0.9	1.4	1.7
	2.週に数回程度	割合	2.1	8.8	4.9	7.9	5.0	0.4	5.3	5.7	3.6	4.4	5.0
	3.週に1回程度	割合	4.9	0.0	9.6	3.3	0.8	0.0	3.8	4.8	1.1	2.5	3.0
	4.月に1回程度	割合	1.4	3.6	3.7	1.1	5.2	0.7	3.3	3.1	2.1	2.5	2.6
	5.全くなかった	割合	36.3	41.7	59.8	53.9	30.8	27.0	46.1	46.9	34.9	39.6	41.6
		標準誤差	9.0	6.2	5.5	6.5	5.5	4.3	2.7	4.6	3.3	2.5	2.6
	6.行かなかった	割合	34.1	29.0	19.8	27.1	54.5	71.8	37.8	27.0	55.6	44.2	39.5
総数			49	66	113	108	102	155	364	228	365	593	
総数	1.ほぼ毎日	割合	33.9	29.1	13.1	18.0	6.9	1.5	11.7	25.6	7.7	15.2	17.6
		標準誤差	6.7	5.2	2.3	2.9	2.6	0.8	1.4	3.3	1.1	1.8	1.4
	2.週に数回程度	割合	3.1	14.2	7.3	11.0	8.3	0.3	7.9	8.9	5.6	7.0	7.5
	3.週に1回程度	割合	2.9	4.8	7.3	5.5	2.1	1.0	4.1	4.8	2.5	3.5	3.7
	4.月に1回程度	割合	1.3	3.9	5.1	2.8	3.6	0.4	3.5	3.8	2.0	2.8	2.8
	5.全くなかった	割合	34.4	33.9	52.6	46.8	35.3	29.2	43.1	40.4	35.9	37.8	38.6
		標準誤差	7.7	5.4	4.3	5.0	4.7	3.7	2.6	3.6	2.8	2.0	1.9
	6.行かなかった	割合	24.3	14.0	14.7	15.9	43.8	67.7	29.6	16.4	46.2	33.7	29.7
総数			88	143	211	215	196	281	708	442	692	1134	

注)

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH22人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

ウ. 学校

性別	回 答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 40-74歳 ※1	(再掲) 20-49歳 ※1	(再掲) 50歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
男性	1.ほぼ毎日	割合	1.7	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.5	0.7
		標準誤差	1.7	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.4	0.5
	2.週に数回程度	割合	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.5	0.6
	3.週に1回程度	割合	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.2	0.2
	4.月に1回程度	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	5.全くなかった	割合	24.9	11.2	11.7	19.7	10.1	15.2	13.7	14.9	14.9	14.9	15.5
		標準誤差	9.8	4.7	3.2	4.3	3.5	4.2	2.2	3.4	2.8	2.3	2.1
	6.行かなかった	割合	69.1	85.6	88.3	80.3	89.9	84.8	86.3	82.4	85.1	83.9	83.1
総数			39	75	98	107	94	126	344	212	327	539	
女性	1.ほぼ毎日	割合	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1
		標準誤差	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1
	2.週に数回程度	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3.週に1回程度	割合	0.0	1.2	1.3	0.0	0.0	0.0	0.3	1.0	0.0	0.4	0.4
	4.月に1回程度	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	5.全くなかった	割合	32.6	25.7	34.9	21.0	14.3	13.4	21.4	30.7	15.5	21.5	23.4
		標準誤差	8.4	6.0	3.3	4.3	4.2	2.4	2.1	3.2	2.3	2.1	2.1
	6.行かなかった	割合	66.6	73.0	63.8	79.0	85.7	86.6	78.2	68.1	84.5	78.0	76.1
総数			49	66	113	108	102	155	364	228	365	593	
総数	1.ほぼ毎日	割合	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.3	0.4
		標準誤差	0.9	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.2	0.2
	2.週に数回程度	割合	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.2	0.3
	3.週に1回程度	割合	0.0	1.1	0.8	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	0.0	0.3	0.3
	4.月に1回程度	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	5.全くなかった	割合	29.5	17.6	25.0	20.3	12.3	14.1	17.6	22.7	15.2	18.4	19.4
		標準誤差	6.7	3.7	2.5	3.2	3.5	2.7	1.7	2.4	2.3	1.8	1.5
	6.行かなかった	割合	67.6	80.0	74.2	79.7	87.7	85.9	82.2	75.3	84.8	80.8	79.6
総数			88	141	211	215	196	281	708	440	692	1132	

注)

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH22人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

エ. 飲食店

性別	回 答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 40-74歳 ※1	(再掲) 20-49歳 ※1	(再掲) 50歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
男性	1.ほぼ毎日	割合	4.3	1.6	1.4	1.2	0.0	0.0	0.8	2.2	0.4	1.2	1.4
		標準誤差	4.1	1.2	0.9	0.9	0.0	0.0	0.4	1.2	0.3	0.6	0.7
	2.週に数回程度	割合	5.2	5.1	6.2	3.2	4.9	0.9	4.3	5.5	2.9	4.0	4.1
	3.週に1回程度	割合	8.7	10.8	8.0	17.7	9.4	0.0	10.0	9.2	8.3	8.7	9.2
	4.月に1回程度	割合	23.3	29.8	16.2	19.0	26.4	10.0	20.7	23.3	17.8	20.2	20.7
		標準誤差	7.0	8.3	5.0	6.1	5.7	5.9	3.2	4.3	4.0	2.9	2.6
	5.全くなかった	割合	17.4	26.2	34.2	33.8	25.2	41.1	32.7	26.9	33.7	30.7	30.0
6.行かなかった	割合	41.1	26.5	33.9	25.1	34.1	48.1	31.6	32.9	36.9	35.1	34.6	
	総数		39	75	98	107	94	126	344	212	327	539	
女性	1.ほぼ毎日	割合	6.8	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	1.1	1.5
		標準誤差	6.0	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.7	1.0
	2.週に数回程度	割合	6.4	2.8	1.9	2.3	2.6	0.7	2.0	3.4	1.6	2.3	2.7
	3.週に1回程度	割合	16.2	6.5	5.6	6.5	1.8	1.7	4.5	8.6	2.9	5.2	6.3
	4.月に1回程度	割合	38.8	25.4	34.0	22.5	14.9	7.2	21.6	32.0	13.1	20.6	23.4
		標準誤差	5.4	5.8	4.9	6.4	5.9	4.2	3.6	3.5	3.1	2.7	2.3
	5.全くなかった	割合	16.2	37.5	38.1	43.1	38.9	31.4	37.9	32.4	36.4	34.8	34.5
6.行かなかった	割合	15.5	25.0	20.4	25.6	41.8	59.1	34.1	21.0	46.0	36.1	31.6	
	総数		49	66	113	108	102	155	364	228	365	593	
総数	1.ほぼ毎日	割合	5.8	2.1	0.6	0.6	0.0	0.0	0.4	2.5	0.2	1.1	1.4
		標準誤差	3.7	1.3	0.4	0.4	0.0	0.0	0.2	1.0	0.1	0.4	0.6
	2.週に数回程度	割合	5.9	4.0	3.8	2.7	3.7	0.8	3.1	4.4	2.2	3.1	3.4
	3.週に1回程度	割合	13.1	8.9	6.7	12.1	5.4	1.0	7.2	8.9	5.4	6.9	7.7
	4.月に1回程度	割合	32.5	27.9	26.4	20.8	20.4	8.3	21.2	27.6	15.3	20.4	22.0
		標準誤差	3.7	5.7	3.4	4.6	5.0	4.1	2.9	3.2	3.1	2.5	1.7
	5.全くなかった	割合	16.7	31.2	36.4	38.4	32.3	35.5	35.3	29.6	35.2	32.8	32.3
6.行かなかった	割合	26.0	25.9	26.1	25.4	38.1	54.4	32.8	27.0	41.8	35.6	33.1	
	総数		88	141	211	215	196	281	708	440	692	1132	

注)

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH22人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

オ. 遊技場(ゲームセンター・パチンコ・競馬場など)

性別	回 答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲)40-74歳※1	(再掲)20-49歳※1	(再掲)50歳以上※1	(再掲)20歳以上※1	(再掲)20歳以上※2
男性	1.ほぼ毎日	割合	6.5	2.8	0.9	2.8	0.0	0.0	1.1	3.1	0.9	1.8	2.1
		標準誤差	3.9	1.7	0.7	1.6	0.0	0.0	0.5	1.2	0.5	0.6	0.7
	2.週に数回程度	割合	8.0	3.3	2.6	1.0	2.8	2.3	2.1	4.3	2.1	3.1	3.2
	3.週に1回程度	割合	10.0	9.5	4.5	10.9	3.8	1.6	5.4	7.8	5.0	6.2	6.8
	4.月に1回程度	割合	12.2	16.1	6.9	6.7	1.4	4.4	4.7	11.8	4.1	7.5	8.0
	5.全くなかった	割合	11.8	17.4	13.9	18.5	13.5	23.8	15.6	14.7	18.9	17.1	16.8
		標準誤差	5.8	5.1	2.9	4.7	3.5	4.7	2.3	3.0	3.0	2.2	1.9
6.行かなかった	割合	51.4	50.8	71.2	60.0	78.5	68.0	71.1	58.4	69.0	64.3	63.0	
	総数		39	75	98	107	94	126	344	212	327	539	
女性	1.ほぼ毎日	割合	6.8	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.3	1.7	0.3	0.8	1.2
		標準誤差	6.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.3	1.5	0.3	0.6	0.9
	2.週に数回程度	割合	7.5	2.8	0.0	0.6	2.8	0.0	1.0	2.8	0.9	1.7	2.2
	3.週に1回程度	割合	0.0	3.0	1.5	0.7	0.0	0.0	0.6	1.7	0.2	0.8	0.9
	4.月に1回程度	割合	13.2	9.6	5.1	1.5	1.8	0.7	2.4	8.8	1.2	4.2	5.2
	5.全くなかった	割合	15.2	20.1	14.3	15.4	9.9	16.6	13.9	16.7	14.4	15.3	15.4
		標準誤差	4.2	5.6	3.5	4.3	3.4	3.1	2.1	3.1	2.4	1.9	1.7
6.行かなかった	割合	57.3	64.5	79.2	81.8	84.6	82.7	81.8	68.2	83.0	77.1	75.2	
	総数		49	66	113	108	102	155	364	228	365	593	
総数	1.ほぼ毎日	割合	6.7	1.6	0.4	1.4	0.5	0.0	0.7	2.4	0.5	1.3	1.7
		標準誤差	3.8	1.0	0.3	0.8	0.5	0.0	0.3	0.9	0.3	0.4	0.6
	2.週に数回程度	割合	7.7	3.1	1.1	0.8	2.8	1.0	1.6	3.6	1.5	2.3	2.7
	3.週に1回程度	割合	4.1	6.6	2.7	5.8	1.8	0.7	3.0	4.8	2.4	3.4	3.8
	4.月に1回程度	割合	12.8	13.2	5.9	4.1	1.6	2.2	3.6	10.3	2.5	5.8	6.6
	5.全くなかった	割合	13.8	18.6	14.1	16.9	11.6	19.6	14.7	15.7	16.5	16.1	16.1
		標準誤差	3.7	4.3	2.2	3.7	3.0	3.2	1.8	2.3	2.4	1.8	1.3
6.行かなかった	割合	54.9	56.9	75.8	70.9	81.7	76.5	76.5	63.3	76.6	71.0	69.1	
	総数		88	141	211	215	196	281	708	440	692	1132	

注)

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH22人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

カ. その他(市役所・病院・公共交通機関など)

性別	回 答	年齢区分	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上	(再掲) 40-74歳 ※1	(再掲) 20-49歳 ※1	(再掲) 50歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
			歳	歳	歳	歳	歳	歳	歳	歳	歳	歳	歳
男性	1.ほぼ毎日	割合	0.0	1.6	0.0	0.0	1.0	0.0	0.3	0.6	0.3	0.5	0.4
		標準誤差	0.0	1.1	0.0	0.0	1.0	0.0	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3
	2.週に数回程度	割合	0.0	0.0	4.1	1.5	1.0	0.6	1.9	1.5	1.0	1.2	1.2
	3.週に1回程度	割合	3.5	1.4	3.5	7.7	6.4	2.6	5.8	2.7	5.3	4.2	4.2
	4.月に1回程度	割合	0.0	4.0	7.1	4.4	16.8	5.5	9.0	4.1	8.7	6.6	6.2
	5.全くなかった	割合	25.7	26.0	34.6	48.3	35.7	56.4	42.5	29.1	47.3	39.2	38.2
		標準誤差	7.5	6.1	6.0	5.5	6.2	5.1	3.4	3.5	3.8	2.3	2.5
6.行かなかった	割合	70.8	67.1	50.7	38.1	39.1	34.9	40.5	62.0	37.3	48.3	49.8	
総数			39	75	98	107	94	126	344	212	327	539	
女性	1.ほぼ毎日	割合	3.2	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.4	0.8	0.3	0.5	0.7
		標準誤差	3.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.3	0.7	0.3	0.3	0.5
	2.週に数回程度	割合	0.0	2.8	0.0	1.5	0.0	0.0	0.4	1.0	0.4	0.6	0.8
	3.週に1回程度	割合	0.0	7.1	0.2	0.0	0.0	0.4	0.0	2.8	0.2	1.2	1.4
	4.月に1回程度	割合	7.0	9.8	14.5	8.4	7.9	4.6	9.3	10.8	6.5	8.2	8.6
	5.全くなかった	割合	42.2	41.8	48.9	45.6	53.3	47.4	50.2	44.6	48.6	47.0	46.4
		標準誤差	8.7	6.9	5.1	5.5	5.8	5.0	3.1	4.3	3.8	3.6	2.6
6.行かなかった	割合	47.6	38.5	36.5	43.0	38.8	47.5	39.7	40.1	44.0	42.4	42.0	
総数			49	66	113	108	102	155	364	228	365	593	
総数	1.ほぼ毎日	割合	1.9	0.9	0.0	0.7	0.5	0.0	0.4	0.7	0.3	0.5	0.6
		標準誤差	1.8	0.6	0.0	0.5	0.5	0.0	0.2	0.4	0.2	0.2	0.3
	2.週に数回程度	割合	0.0	1.2	1.8	1.5	0.5	0.3	1.2	1.2	0.7	0.9	1.0
	3.週に1回程度	割合	1.4	3.9	1.6	3.8	3.1	1.4	2.9	2.8	2.5	2.6	2.8
	4.月に1回程度	割合	4.2	6.5	11.3	6.4	12.1	5.0	9.2	7.4	7.5	7.5	7.4
	5.全くなかった	割合	35.5	33.0	42.8	47.0	44.9	51.2	46.4	36.8	48.0	43.3	42.3
		標準誤差	7.1	5.2	3.9	3.9	4.8	3.8	2.5	3.0	3.2	2.6	1.8
6.行かなかった	割合	57.1	54.5	42.5	40.5	38.9	42.2	40.1	51.2	40.9	45.2	45.9	
総数			88	141	211	215	196	281	708	440	692	1132	

注)

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH22人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

問20 たばこについてお聞きします。あなたはこの1ヶ月間に自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか。次のアからカの質問についてあてはまる番号を1つ選んで○印をつけてください。

問21 これまでの喫煙経験について

性別	回 答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 40-74歳 ※1	(再掲) 20-49歳 ※1	(再掲) 50歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
男性	1,合計100本以上、または6ヶ月以上吸っている(吸っていた)	割合	54.0	60.2	70.3	59.8	70.4	55.7	65.0	62.2	61.7	61.9	61.5
		標準誤差	10.6	8.8	5.3	4.6	5.4	3.4	2.6	4.6	2.4	2.4	2.7
	2.吸っている(吸ったことはある)が、合計100本未満で6か月未満である。	割合	6.7	6.8	10.8	11.0	12.0	11.9	11.6	8.3	11.7	10.2	9.9
	3.まったく吸ったことがない	割合	39.3	33.1	18.8	29.1	17.6	32.4	23.5	29.5	26.6	27.9	28.6
	総数		39	77	98	107	95	127	346	214	329	543	
女性	1,合計100本以上、または6ヶ月以上吸っている(吸っていた)	割合	15.9	21.2	16.8	4.0	7.3	3.1	7.9	18.2	4.6	10.0	11.2
		標準誤差	5.7	5.0	4.0	1.5	2.5	1.4	1.5	2.7	1.1	1.4	1.5
	2.吸っている(吸ったことはある)が、合計100本未満で6か月未満である。	割合	5.1	5.4	12.0	2.0	2.1	0.7	4.5	7.8	1.4	4.0	4.4
	3.まったく吸ったことがない	割合	79.0	73.4	71.2	94.0	90.6	96.2	87.6	74.0	94.0	86.1	84.4
	総数		49	67	113	108	102	156	365	229	366	595	
総数	1,合計100本以上、または6ヶ月以上吸っている(吸っていた)	割合	31.4	43.1	39.6	31.9	37.6	25.2	36.3	40.6	30.7	34.9	36.4
		標準誤差	5.5	5.2	3.0	3.5	3.0	2.2	1.6	2.6	1.3	1.2	1.6
	2.吸っている(吸ったことはある)が、合計100本未満で6か月未満である。	割合	5.8	6.2	11.5	6.5	6.8	5.4	8.0	8.1	6.1	6.9	7.1
	3.まったく吸ったことがない	割合	62.8	50.7	48.9	61.6	55.6	69.4	55.7	51.4	63.1	58.2	56.5
	総数		88	144	211	215	197	283	711	443	695	1138	

注)

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH22人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

問21 たばこについてお聞きます。あなたはこれまでにたばこを吸ったことがありますか。あてはまるもの1つだけ選んで○印をつけてください。

問21-2 1日に吸う喫煙本数

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 40-74歳 ※1	(再掲) 20歳以上 ※1
男性	1~10本	割合	30.1	25.0	40.5	22.3	15.9	31.3	24.3	26.9
		標準誤差	14.8	6.4	6.7	6.1	5.4	7.2	2.6	2.8
	11~20本	割合	69.9	52.9	49.6	46.8	45.7	55.6	51.3	52.3
		標準誤差	14.8	8.5	8.1	8.5	7.2	8.5	3.7	4.4
	21~30本	割合	0.0	10.2	6.5	14.6	17.7	1.1	12.2	9.2
		標準誤差	-	4.9	3.0	4.8	6.2	1.1	2.8	1.8
	31~40本	割合	0.0	9.7	3.5	14.3	18.0	6.1	10.8	9.2
		標準誤差	-	6.2	2.6	4.5	6.8	2.5	2.6	2.3
	41本以上	割合	0.0	2.2	0.0	2.0	2.7	5.1	1.5	2.3
		標準誤差	-	2.2	-	1.3	2.1	2.6	0.8	1.0
	未回答	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.2
		標準誤差	-	-	-	-	-	0.8	-	0.2
	平均値(本)			15.3	19.9	15.6	22.3	23.0	20.6	19.8
標準偏差			4.7	11.4	8.4	11.1	12.1	17.2	12.2	10.7
標準誤差			1.3	1.7	1.0	1.2	1.7	1.7	0.6	0.6
総数			16	49	67	68	64	68	218	329
女性	1~10本	割合	60.2	67.7	62.9	53.9	33.2	63.8	53.1	59.8
		標準誤差	15.3	15.0	13.1	19.0	18.6	21.8	10.5	6.9
	11~20本	割合	28.2	32.3	28.7	30.8	59.6	36.2	38.0	34.5
		標準誤差	16.6	15.0	15.5	16.9	19.3	21.8	11.9	7.9
	21~30本	割合	11.6	0.0	8.4	0.0	7.3	0.0	6.8	4.7
		標準誤差	9.7	-	6.7	0.0	7.4	-	4.5	2.6
	31~40本	割合	0.0	0.0	0.0	15.3	0.0	0.0	2.1	0.9
		標準誤差	-	-	-	14.2	-	-	2.2	0.9
	41本以上	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		標準誤差	-	-	-	-	-	-	-	-
	未回答	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		標準誤差	-	-	-	-	-	-	-	-
	平均値(本)			12.4	10.9	12.0	17.7	14.8	11.1	12.3
標準偏差			8.2	4.7	6.4	11.2	6.4	6.9	6.6	7.3
標準誤差			2.4	1.5	1.1	4.1	2.0	2.9	0.7	1.0
総数			11	14	18	8	8	5	34	64
総数	1~10本	割合	39.1	34.2	45.9	24.2	17.6	33.7	27.4	31.8
		標準誤差	12.1	4.9	6.0	6.3	4.9	7.1	2.8	2.6
	11~20本	割合	57.4	48.5	44.5	45.8	47.0	54.2	49.8	49.7
		標準誤差	12.9	6.6	6.7	8.3	6.7	8.1	3.5	3.8
	21~30本	割合	3.5	8.0	6.9	13.7	16.7	1.0	11.6	8.5
		標準誤差	3.4	3.8	2.3	4.4	5.5	1.0	2.3	1.4
	31~40本	割合	0.0	7.6	2.6	14.3	16.2	5.6	9.8	7.9
		標準誤差	-	5.0	2.0	4.4	6.2	2.4	2.4	2.0
	41本以上	割合	0.0	1.7	0.0	1.9	2.5	4.7	1.3	1.9
		標準誤差	-	1.8	-	1.2	1.9	2.4	0.7	0.9
	未回答	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.1
		標準誤差	-	-	-	-	-	0.7	-	0.1
	平均値(本)			14.4	18.0	14.8	22.0	22.2	19.9	18.7
標準偏差			6.0	11.0	8.1	11.1	11.9	16.9	11.9	10.6
標準誤差			1.3	1.3	0.8	1.3	1.6	1.6	0.6	0.6
総数			27	63	85	76	72	73	252	393

注)

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと県の実際のH22人口構成に合わせるための重み付けをして算出している。

問21-2 あなたは、通常、1日に何本たばこを吸いますか(吸っていましたか) (「ときどき吸う方」は吸うときの1日の本数をお答えください)

問21-3 習慣的にたばこを吸うようになった年齢

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 40-74歳 ※1	(再掲) 20歳以上 ※1
男性	14-19歳	割合	49.0	31.1	15.8	20.5	15.1	25.5	24.0	16.7
		標準誤差	15.3	7.7	4.8	5.5	4.9	7.0	3.3	2.9
	20-25歳	割合	51.0	63.7	76.1	79.5	79.7	71.2	72.0	78.3
		標準誤差	15.3	9.4	6.4	5.5	5.3	6.6	3.4	3.2
	25-29歳	割合	0.0	5.2	8.1	0.0	5.2	3.3	4.0	5.0
		標準誤差	-	3.5	3.9	0.0	3.1	2.7	1.1	1.6
	30-39歳	割合	-	0.0	0.8	0.0	0.0	0.8	0.3	0.3
		標準誤差	-	-	0.8	0.0	0.0	0.8	0.2	0.3
	40-49歳	割合	-	-	0.0	2.6	0.0	1.4	0.7	0.6
		標準誤差	-	-	-	2.4	0.0	1.4	0.5	0.6
	50歳以上	割合	-	-	-	0.0	0.0	1.7	0.3	0.0
		標準誤差	-	-	-	-	0.0	1.6	0.3	-
	未回答	割合	0.0	6.7	0.0	0.0	0.8	0.0	1.3	0.3
		標準誤差	-	6.1	-	-	0.8	0.0	1.1	0.3
平均値(歳)			18.9	18.1	20.3	20.2	19.9	20.8	19.8	20.2
標準偏差			1.3	5.4	2.0	3.4	2.5	5.1	3.8	2.5
標準誤差			0.4	1.1	0.2	0.5	0.2	0.5	0.3	0.2
総数			16	48	65	66	62	65	322	215
女性	14-19歳	割合	9.5	5.8	18.0	12.7	0.0	50.0	11.7	13.1
		標準誤差	7.1	5.8	15.4	12.3	0.0	35.8	5.3	10.1
	20-25歳	割合	90.5	94.2	82.0	87.3	85.7	50.0	86.9	83.4
		標準誤差	7.1	5.8	15.4	12.3	14.1	35.8	5.3	10.3
	25-29歳	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	0.0	1.5	3.5
		標準誤差	-	-	0.0	0.0	14.1	0.0	1.4	3.4
	30-39歳	割合	-	0.0	6.2	0.0	17.4	0.0	3.8	8.7
		標準誤差	-	-	4.5	0.0	15.9	0.0	2.4	5.5
	40-49歳	割合	-	-	0.0	15.3	10.5	24.1	4.4	5.3
		標準誤差	-	-	-	14.2	8.3	20.8	2.5	3.2
	50歳以上	割合	-	-	-	0.0	0.0	31.3	2.9	0.0
		標準誤差	-	-	-	-	-	20.0	2.1	-
	未回答	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		標準誤差	-	-	-	-	-	-	-	-
平均値(歳)			19.8	20.3	21.0	22.8	26.3	34.9	22.6	22.8
標準偏差			1.3	0.6	2.9	7.9	7.8	14.2	6.9	5.9
標準誤差			0.3	0.2	0.7	2.9	2.5	5.7	1.0	1.1
総数			11	14	16	7	5	2	55	28
総数	14-19歳	割合	37.2	25.3	16.3	20.1	13.9	26.3	22.3	16.3
		標準誤差	12.4	6.2	5.0	5.5	4.6	6.8	2.8	2.7
	20-25歳	割合	62.8	70.6	77.5	79.9	80.2	70.5	74.1	78.8
		標準誤差	12.4	7.4	5.6	5.5	5.2	6.4	2.8	2.9
	25-29歳	割合	0.0	4.0	6.2	0.0	5.9	3.1	3.6	4.9
		標準誤差	-	2.7	2.8	0.0	3.3	2.7	1.0	1.5
	30-39歳	割合	-	0.0	2.1	0.0	1.7	0.7	0.8	1.2
		標準誤差	-	-	1.3	0.0	1.7	0.7	0.4	0.7
	40-49歳	割合	-	-	0.0	3.4	1.0	3.0	1.2	1.1
		標準誤差	-	-	-	2.4	0.8	2.1	0.5	0.6
	50歳以上	割合	-	-	-	0.0	0.0	3.9	0.7	0.0
		標準誤差	-	-	-	-	-	2.1	0.4	-
	未回答	割合	0.0	5.3	0.0	0.0	0.7	0.0	1.1	0.2
		標準誤差	-	4.9	-	-	0.7	-	0.9	0.3
平均値(歳)			19.2	18.6	20.5	20.4	20.5	21.8	20.2	20.5
標準偏差			1.3	4.8	2.2	3.8	3.8	7.0	4.5	3.2
標準誤差			0.3	0.9	0.2	0.5	0.3	0.8	0.3	0.2
総数			27	62	81	73	67	67	377	243

※1 保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと県の実際のH22人口構成に合わせるための重み付けを計算。

問21-3 何歳の時から習慣的にたばこを吸うようになりましたか。

問22 現在(この1ヶ月間)の喫煙状況について

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 40-74歳 ※1	(再掲) 20-49歳 ※1	(再掲) 50歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※1	年齢調整 値(20歳以上) ※2
男性	1.毎日吸う	割合	89.0	54.5	46.4	27.8	30.7	15.1	33.9	58.5	24.6	39.4	42.9
		標準誤差	5.6	8.0	7.9	3.9	6.1	5.0	3.8	5.2	3.0	3.1	2.5
	2.ときどき吸っている	割合	5.2	3.3	4.0	0.0	2.1	1.4	1.9	4.1	1.3	2.5	2.6
	3.今は(この1ヶ月間 吸っていない)	割合	5.8	42.3	49.6	72.2	67.2	83.5	64.2	37.4	74.2	58.1	54.5
	(再掲)毎日吸う及び ときどき吸っている	割合	94.2	57.7	50.4	27.8	32.8	16.5	35.8	62.6	25.8	41.9	45.5
		標準誤差	4.2	8.2	7.8	3.9	6.1	4.8	3.9	5.3	2.9	3.2	2.5
総数			21	53	75	82	75	82	260	149	239	388	
女性	1.毎日吸う	割合	77.1	55.2	18.1	20.7	57.7	11.3	28.2	44.2	35.0	41.8	39.1
		標準誤差	11.8	13.1	8.1	11.9	16.1	11.2	7.5	7.3	7.7	5.9	5.0
	2.ときどき吸っている	割合	0.0	2.7	3.6	0.0	0.0	36.5	2.3	2.6	10.6	4.7	7.5
	3.今は(この1ヶ月間 吸っていない)	割合	22.9	42.2	78.3	79.3	42.3	52.2	69.5	53.3	54.4	53.6	53.4
	(再掲)毎日吸う及び ときどき吸っている	割合	77.1	57.8	21.7	20.7	57.7	47.8	30.5	46.7	45.6	46.4	46.6
		標準誤差	11.8	13.0	9.0	11.9	16.1	20.9	8.0	7.5	8.6	6.5	5.9
総数			13	18	28	10	11	6	49	59	27	86	
総数	1.毎日吸う	割合	85.0	54.6	37.3	27.2	33.7	14.8	33.1	54.7	25.5	39.8	41.0
		標準誤差	5.3	7.0	6.5	3.7	5.8	4.9	3.6	4.2	2.9	2.7	2.8
	2.ときどき吸っている	割合	3.5	3.1	3.9	0.0	1.9	4.0	2.0	3.7	2.1	2.9	5.0
	3.今は(この1ヶ月間 吸っていない)	割合	11.5	42.2	58.9	72.8	64.4	81.2	65.0	41.5	72.4	57.3	54.0
	(再掲)毎日吸う及び ときどき吸っている	割合	88.5	57.8	41.1	27.2	35.6	18.8	35.0	58.5	27.6	42.7	46.0
		標準誤差	4.8	7.0	6.6	3.7	5.9	4.8	3.8	4.4	2.9	2.8	3.2
総数			34	71	103	92	86	88	309	208	266	474	

注)

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと県の実際のH22人口構成に合わせるための重み付けをしてを算出している。

※2 基準はH17国勢調査男女総人口

問22 現在(この1ヶ月間)、あなたはたばこを吸っていますか。1つだけ選んで○印をつけてください。

問22-2 禁煙の意志について

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 40-74歳 ※1	(再掲) 20-49歳※1	(再掲) 50歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※1	年齢調整値 (20歳以上) ※2	
男性	1.やめたい	割合	49.1	33.7	50.5	22.1	26.6	23.9	34.6	44.6	24.4	37.6	33.6	
		標準誤差	14.5	8.3	9.2	11.0	8.6	13.7	5.2	6.6	6.2	4.7	4.6	
	2.本数を減らしたい	割合	22.5	50.2	30.2	40.8	55.6	42.0	41.7	34.3	48.0	39.0	40.6	
		標準誤差	14.4	9.2	8.7	11.0	10.7	20.0	6.5	7.5	8.3	5.9	5.3	
	3.やめたくない	割合	13.4	10.1	13.7	26.5	7.5	20.2	14.0	12.3	16.4	13.7	15.6	
		標準誤差	8.1	5.4	7.3	7.8	4.8	12.2	3.8	4.1	5.5	3.7	3.3	
	4.わからない	割合	15.0	5.9	4.4	10.6	10.3	13.9	9.1	8.5	11.2	9.4	10.0	
	5.未回答	割合	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.5	0.4	0.0	0.3	0.2	
	総数			19	32	40	25	27	12	97	91	64	155	
	女性	1.やめたい	割合	40.7	65.6	58.0	62.0	50.2	61.8	56.6	56.5	56.1	56.4	56.9
標準誤差			11.6	18.7	17.6	30.2	21.0	29.5	12.5	9.9	15.4	8.4	9.5	
2.本数を減らしたい		割合	25.8	34.4	10.9	38.0	26.1	38.2	19.6	26.7	32.7	27.6	29.5	
		標準誤差	16.8	18.7	9.4	30.2	19.0	29.5	9.4	10.6	6.8	9.1	9.3	
3.やめたくない		割合	7.0	0.0	0.0	0.0	23.7	0.0	10.9	2.5	13.6	5.3	4.7	
		標準誤差	7.3	0.0	0.0	0.0	16.0	0.0	7.8	2.6	9.4	3.0	2.7	
4.わからない		割合	26.5	0.0	31.2	0.0	0.0	0.0	12.9	14.3	0.0	10.6	8.8	
5.未回答		割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
総数			10	9	9	3	7	3	19	28	13	41		
総数		1.やめたい	割合	46.7	41.2	51.7	24.3	30.9	30.9	37.3	47.1	29.1	41.1	45.3
	標準誤差		10.8	8.9	8.1	10.6	8.9	12.3	5.1	6.0	6.3	4.7	5.3	
	2.本数を減らしたい	割合	23.5	46.5	27.1	40.6	50.3	41.3	39.0	45.4	0.0	36.9	35.1	
		標準誤差	11.3	9.7	7.7	10.5	10.1	16.7	6.0	7.3	0.0	5.5	5.4	
	3.やめたくない	割合	11.5	7.7	11.5	25.0	10.4	16.5	13.7	10.2	16.0	12.1	10.1	
		標準誤差	6.1	4.1	6.5	7.3	4.8	9.7	3.5	3.2	5.0	3.0	2.1	
	4.わからない	割合	18.4	4.5	8.8	10.1	8.4	11.3	9.6	9.7	9.5	9.6	9.4	
	5.未回答	割合	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.3	0.0	0.2	0.1	
	総数			29	41	49	28	34	15	116	119	77	196	

注)

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと県の実際のH22人口構成に合わせるための重み付けをしてを算出している。

※2 基準はH17国勢調査男女総人口

問22-2 たばこをやめたいと思いますか。(問22-1で(1)毎日吸う または(2)ときどき吸っていると答えた人のみ回答)

問22-3 たばこを最後に吸った年齢(問22で今は(この1カ月間)吸っていないと答えた人)

性別	回 答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 40-74歳 ※1	(再掲) 20歳以上 ※1
男性	20-24歳	割合	58.4	18.6	22.6	8.1	1.1	0.0	8.1	7.8
		標準誤差	34.8	13.6	9.3	3.6	1.0	0.0	2.3	2.6
	25-29歳	割合	41.6	13.2	5.9	12.6	12.1	0.8	8.5	9.5
		標準誤差	34.8	6.1	3.2	4.8	5.4	0.8	1.6	2.2
	30-39歳	割合	0.0	65.7	29.0	13.8	22.3	12.6	23.2	21.8
		標準誤差	—	11.9	7.6	4.7	8.8	4.0	3.2	4.2
	40-49歳	割合	—	—	43.1	37.6	19.9	14.9	24.6	31.1
		標準誤差	—	—	10.0	7.1	6.3	4.2	3.0	3.7
	50-59歳	割合	—	—	—	27.8	8.0	17.1	13.1	13.7
		標準誤差	—	—	—	8.4	4.4	6.6	3.1	3.9
	60-69歳	割合	—	—	—	—	35.4	24.9	13.8	13.8
		標準誤差	—	—	—	—	8.1	5.0	2.4	3.0
	70歳以上	割合	—	—	—	—	—	28.9	7.8	1.2
		標準誤差	—	—	—	—	—	6.0	1.9	0.9
(再掲)50歳以上	割合	—	—	—	27.8	43.4	71.0	34.7	28.7	
	標準誤差	—	—	—	8.4	8.2	4.8	3.7	4.6	
未回答	割合	0.0	2.3	0.0	0.0	1.0	0.8	0.7	0.3	
	標準誤差	—	—	—	—	—	—	—	—	
平均値(歳)			23.4	29.7	35.0	41.1	46.3	56.9	44.3	42.9
標準偏差			4.2	7.5	8.8	10.6	15.4	15.1	15.8	13.8
標準誤差			2.1	1.8	2.0	1.8	2.5	1.9	1.2	1.1
総数			2	21	35	57	48	70	233	163
女性	20-24歳	割合	74.7	37.4	21.8	25.6	0.0	0.0	25.4	19.2
		標準誤差	23.4	17.5	10.4	17.4	0.0	0.0	6.5	7.5
	25-29歳	割合	25.3	0.0	20.2	12.9	23.8	0.0	14.0	19.6
		標準誤差	23.4	0.0	8.7	12.6	22.3	0.0	5.6	7.4
	30-39歳	割合	—	63.8	45.2	16.9	0.0	0.0	36.8	37.0
		標準誤差	—	17.3	14.9	13.4	0.0	0.0	9.5	11.6
	40-49歳	割合	—	—	13.2	12.9	23.2	0.0	10.4	14.1
		標準誤差	—	—	7.8	12.6	22.0	0.0	4.9	6.6
	50-59歳	割合	—	—	—	32.4	5.9	37.7	5.9	5.0
		標準誤差	—	—	—	24.2	6.6	29.2	3.8	4.3
	60-69歳	割合	—	—	—	—	47.7	35.0	5.4	4.5
		標準誤差	—	—	—	—	30.0	28.3	3.7	4.5
	70歳以上	割合	—	—	—	—	—	27.3	1.6	0.0
		標準誤差	—	—	—	—	—	24.6	1.6	0.0
(再掲)50歳以上	割合	—	—	—	32.4	53.6	100.0	12.9	9.5	
	標準誤差	—	—	—	24.2	28.8	0.0	5.2	6.1	
未回答	割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	標準誤差	—	—	—	—	—	—	—	—	
平均値(歳)			21.6	28.2	30.1	37.1	51.9	64.9	34.3	34.2
標準偏差			2.4	5.3	7.2	13.0	17.9	12.7	14.2	12.4
標準誤差			1.0	1.8	1.9	5.5	9.0	5.9	2.0	2.9
総数			3	9	19	7	4	3	45	30
総数	20-24歳	割合	67.5	23.7	22.3	9.6	1.0	0.0	10.9	9.6
		標準誤差	20.5	10.5	8.6	3.7	1.0	0.0	2.5	2.9
	25-29歳	割合	32.5	9.6	11.0	12.6	12.9	0.8	9.4	11.0
		標準誤差	20.5	4.7	3.9	4.5	5.2	0.8	1.6	2.1
	30-39歳	割合	—	65.3	35.9	14.0	20.7	12.0	25.7	24.7
		標準誤差	—	10.5	7.7	4.5	8.3	3.8	3.2	4.8
	40-49歳	割合	—	—	30.3	35.5	20.2	14.2	22.0	27.9
		標準誤差	—	—	7.9	6.6	6.2	3.9	3.0	3.7
	50-59歳	割合	—	—	—	28.2	7.9	18.1	11.8	12.0
		標準誤差	—	—	—	7.6	4.1	6.4	2.6	3.3
	60-69歳	割合	—	—	—	—	36.2	25.4	12.3	12.1
		標準誤差	—	—	—	—	8.5	5.0	2.1	2.6
	70歳以上	割合	—	—	—	—	—	28.8	6.7	1.0
		標準誤差	—	—	—	—	—	5.7	1.6	0.7
(再掲)50歳以上	割合	—	—	—	28.2	44.1	72.3	30.7	25.1	
	標準誤差	—	—	—	7.6	8.3	4.4	3.5	4.2	
未回答	割合	0.0	1.8	0.0	0.0	1.0	0.7	0.5	0.2	
	標準誤差	—	—	—	—	—	—	—	—	
平均値(歳)			22.2	29.3	32.9	40.8	46.7	57.3	42.7	41.5
標準偏差			2.8	7.0	8.4	10.8	15.5	15.0	16.0	13.9
標準誤差			1.1	1.5	1.9	1.7	2.7	1.8	1.2	1.1
総数			5	30	54	64	52	73	278	193

※1 保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けと県の実際のH22人口構成に合わせるための重み付けをして算出。

問22-3 あなたがたばこを最後に吸ったのは、何歳の時でしたか

問22-4 喫煙率

性別	回 答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 40-74歳 ※1	(再掲) 20-49歳※ 1	(再掲) 50歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
			割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合	割合
男性	1.現在習慣的に喫煙している	割合	54.0	35.9	38.1	18.1	24.7	10.6	25.5	41.3	17.5	28.1	29.5
		標準誤差	10.6	6.1	6.2	2.6	4.8	3.4	2.7	4.4	2.0	2.3	2.4
	2.過去習慣的に喫煙していた	割合	0.0	24.2	32.2	41.7	45.8	45.2	39.5	20.9	44.2	33.8	32.0
		標準誤差	0.0	6.8	7.1	4.7	5.6	3.6	3.5	3.8	2.8	2.4	2.1
3.喫煙しない(習慣的でない喫煙含む)	割合	46.0	39.8	29.7	40.2	29.6	44.3	35.0	37.8	38.3	38.1	38.5	
総数			39	77	98	107	95	127	346	214	329	543	-
女性	1.現在習慣的に喫煙している	割合	11.1	14.7	5.6	1.2	5.4	1.1	3.6	10.4	2.4	5.6	6.4
		標準誤差	4.0	4.5	2.5	0.8	2.0	0.8	1.0	2.0	0.7	0.9	1.1
	2.過去習慣的に喫煙していた	割合	4.8	6.6	11.2	2.8	1.9	2.0	4.3	7.8	2.2	4.4	4.8
		標準誤差	2.9	3.2	4.0	1.3	1.8	1.2	1.4	2.0	0.7	1.0	1.0
3.喫煙しない(習慣的でない喫煙含む)	割合	84.1	78.8	83.2	96.0	92.7	96.9	92.1	81.8	95.4	90.0	88.8	
総数			39	77	98	107	95	127	365	229	366	595	-
総数	1.現在習慣的に喫煙している	割合	28.6	26.6	19.5	9.7	14.6	5.1	14.5	26.1	9.3	16.4	18.0
		標準誤差	4.9	3.7	3.0	1.5	2.5	1.6	1.5	2.6	1.1	1.2	1.3
	2.過去習慣的に喫煙していた	割合	2.9	16.5	20.1	22.2	22.9	20.1	21.8	14.5	21.4	18.5	18.4
		標準誤差	1.7	4.3	3.1	3.0	3.1	1.9	1.8	2.0	1.3	1.2	1.2
3.喫煙しない(習慣的でない喫煙含む)	割合	68.6	56.9	60.4	68.1	62.4	74.8	63.7	59.4	69.3	65.1	63.6	
総数			88	144	211	215	197	283	711	443	695	1138	

注)

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH22人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

◇現在習慣的に喫煙している者:これまで合計100本以上、または6ヶ月以上たばこを吸っている(吸っていた)者のうち、「この1ヶ月間に毎日又はときどきたばこを吸っている」と回答した者

◇過去習慣的に喫煙していた者:これまで合計100本以上、または6ヶ月以上たばこを吸っている(吸っていた)者のうち、「この1ヵ月間にたばこを吸っていない」と回答した者

◇喫煙しない者:「まったく吸ったことがない」または「吸ったことはあるが合計100本未満である」と回答した者

問23 1日あたりの適正飲酒量に対する認識

性別	回答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 40-74歳 ※1	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
男性	1. 日本酒1合以下	割合	47.0	52.8	35.6	36.6	31.8	46.2	48.9	41.4	41.9
		標準誤差	8.5	6.3	4.8	5.4	7.2	6.2	7.1	2.8	2.6
	2. 日本酒1合くらい	割合	41.6	36.2	46.1	38.3	42.3	38.8	34.2	40.5	40.3
		標準誤差	7.9	6.6	6.0	5.6	5.9	5.3	6.4	2.4	2.5
	3. 日本酒2合くらい	割合	1.4	9.9	12.5	23.6	21.1	13.7	14.9	14.2	14.0
		標準誤差	1.4	4.0	4.1	3.3	3.8	3.7	4.8	1.7	1.5
	4. 日本酒3合以上	割合	10.1	1.1	5.8	1.5	4.8	1.3	2.0	3.9	3.9
		標準誤差	8.2	1.1	3.0	1.0	3.2	1.1	1.9	1.3	1.4
	(再掲) 日本酒1合以下 & 一合くらい	割合	88.5	89.0	81.7	74.9	74.1	85.0	83.1	81.9	82.2
		標準誤差	8.2	4.1	5.2	3.4	5.6	3.7	4.5	2.2	2.1
総数			37	65	85	99	77	103	67	466	
女性	1. 日本酒1合以下	割合	64.4	43.2	56.7	50.4	48.3	53.2	51.4	52.4	52.4
		標準誤差	8.1	9.5	5.5	5.6	7.4	4.6	6.0	2.9	2.9
	2. 日本酒1合くらい	割合	28.8	49.6	33.0	46.7	46.0	42.9	45.8	42.0	41.6
		標準誤差	7.2	8.3	4.9	5.4	7.7	4.2	5.6	2.5	2.6
	3. 日本酒2合くらい	割合	0.0	7.2	10.2	2.9	4.6	3.2	1.6	4.5	4.7
		標準誤差	0.0	3.9	3.1	1.3	2.1	1.8	1.6	1.0	1.0
	4. 日本酒3合以上	割合	6.8	0.0	0.0	0.0	1.1	0.8	1.1	1.1	1.3
		標準誤差	5.7	0.0	0.0	0.0	1.1	0.8	1.2	0.7	0.9
	(再掲) 日本酒1合以下 & 一合くらい	割合	93.2	92.8	89.8	97.1	94.3	96.1	97.2	94.3	94.0
		標準誤差	5.7	3.9	3.1	1.3	2.7	1.9	2.0	1.0	1.4
総数			47	58	97	100	78	132	101	512	
総数	1. 日本酒1合以下	割合	57.4	48.5	47.7	43.5	40.2	50.3	50.5	47.1	47.1
		標準誤差	5.6	5.9	3.7	4.4	4.8	3.4	4.1	1.9	1.9
	2. 日本酒1合くらい	割合	33.9	42.2	38.6	42.5	44.1	41.2	41.7	41.3	41.0
		標準誤差	5.0	5.7	4.2	4.3	3.5	3.0	4.4	1.7	1.8
	3. 日本酒2合くらい	割合	0.6	8.7	11.2	13.2	12.8	7.4	6.4	9.2	9.3
		標準誤差	0.6	3.1	2.3	2.1	2.0	1.9	1.8	1.0	0.9
	4. 日本酒3合以上	割合	8.1	0.6	2.5	0.8	2.9	1.0	1.4	2.5	2.6
		標準誤差	4.4	0.6	1.3	0.5	1.6	0.6	1.0	0.7	0.9
	(再掲) 日本酒1合以下 & 一合くらい	割合	91.3	90.7	86.3	86.0	84.3	91.6	92.2	88.4	88.1
		標準誤差	4.3	3.3	2.9	2.2	3.0	1.9	1.8	1.1	1.2
総数			84	123	182	199	155	235	168	978	

注)

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH22人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

問23 お酒についてお聞きします。あなたは1日あたりの適当な飲酒量とはどのくらいだと思いますか。下の表を参考に、日本酒に換算した場合のあてはてるものに1つだけ○印をしてください。

問24-1 飲酒習慣について(頻度)

性別	回 答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 40-74歳 ※1	(再掲) 20-49歳 ※1	(再掲) 50歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
男性	1.毎日	割合	13.7	28.4	26.5	36.9	45.4	26.0	35.1	24.0	35.7	30.5	29.7
		標準誤差	8.7	4.8	4.2	5.4	5.6	4.8	3.0	3.2	3.7	2.8	2.3
	2.週5～6日	割合	4.1	9.5	12.7	13.4	16.8	14.7	15.4	9.3	14.9	12.4	11.9
	3.週3～4日	割合	7.2	9.5	9.1	9.6	3.4	5.8	7.3	8.8	6.0	7.3	7.5
	4.週1～2日	割合	10.7	10.5	17.5	14.2	7.6	7.0	12.1	13.2	9.3	11.1	11.2
	5.月1～3日	割合	38.0	12.3	12.4	6.1	3.0	9.2	6.7	18.7	6.3	11.8	13.1
	6.やめた(1年以上やめている)	割合	0.0	2.7	1.7	0.2	1.9	7.3	2.7	1.7	3.4	2.6	2.4
	7.ほとんど飲まない(飲めない)	割合	26.2	27.1	20.2	19.7	21.9	30.1	20.7	24.4	24.4	24.4	24.3
	総数	39	77	99	107	95	127	347	215	329	544		
女性	1.毎日	割合	2.6	7.3	4.8	8.1	3.0	1.2	4.7	5.2	3.4	4.2	4.6
		標準誤差	1.7	3.4	2.1	2.5	1.7	0.7	1.1	1.5	0.9	0.9	0.9
	2.週5～6日	割合	0.0	8.7	4.6	7.3	7.7	0.7	5.6	4.9	4.3	4.5	4.9
	3.週3～4日	割合	4.8	4.0	14.3	7.4	3.3	2.0	7.7	7.9	3.7	5.4	5.9
	4.週1～2日	割合	24.7	9.3	10.1	9.1	7.0	8.7	9.4	13.5	8.2	10.3	11.2
	5.月1～3日	割合	19.9	18.0	15.4	13.7	10.7	10.5	13.4	17.6	11.3	13.8	14.6
	6.やめた(1年以上やめている)	割合	7.9	2.9	1.6	3.1	0.5	0.7	1.5	3.6	1.3	2.2	2.7
	7.ほとんど飲まない(飲めない)	割合	40.1	49.8	49.2	51.4	67.8	76.2	57.7	47.2	67.8	59.6	56.0
	総数	49	67	113	108	102	156	365	229	366	595		

注)

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH22人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

性別	回 答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 40-74歳 ※1	(再掲) 20-49歳 ※1	(再掲) 50歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
総数	1.毎日	割合	7.2	19.2	14.1	22.5	23.3	11.6	19.8	14.8	18.2	16.8	17.1
		標準誤差	3.8	2.8	1.8	2.7	2.9	2.2	1.6	1.8	1.9	1.5	1.2
	2.週5～6日	割合	1.7	9.1	8.1	10.4	12.1	6.6	10.5	7.1	9.1	8.3	8.4
	3.週3～4日	割合	5.8	7.1	12.1	8.5	3.3	3.6	7.5	8.4	4.8	6.3	6.7
	4.週1～2日	割合	19.0	10.0	13.2	11.6	7.3	8.0	10.7	13.3	8.7	10.7	11.2
	5.月1～3日	割合	27.3	14.8	14.1	9.9	7.0	10.0	10.1	18.2	9.0	12.8	13.9
	6.やめた(1年以上やめている)	割合	4.7	2.8	1.6	1.7	1.2	3.5	2.1	2.6	2.2	2.4	2.6
	7.ほとんど飲まない(飲めない)	割合	34.5	37.0	36.7	35.5	45.8	56.9	39.3	35.6	47.9	42.7	40.1
	総数		88	144	212	215	197	283	712	444	695	1139	

注)

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH22人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

問24 あなたは週に何日くらいお酒(日本酒、焼酎、ビール洋酒など)を飲みますか。1つだけ選んで○印を記入してください。

問24-2 飲酒日一日あたりの飲酒量について

性別	回 答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 40-74歳 ※1	(再掲) 20-49歳 ※1	(再掲) 50歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
男性	1.1合(180ml)	割合	42.2	31.2	46.6	33.9	47.3	65.6	46.3	39.8	48.9	44.7	44.3
		標準誤差	12.2	6.7	5.8	5.2	6.8	7.1	3.1	4.2	3.5	2.8	3.1
	2.1合以上2合(360ml)未満	割合	26.7	44.9	20.9	27.1	27.7	21.1	24.8	31.2	25.3	28.0	28.3
		標準誤差	11.4	6.9	4.4	4.2	4.7	6.6	2.5	3.9	3.4	2.6	2.7
	3.2合以上3合(540ml)未満	割合	0.7	8.7	17.7	26.4	17.3	7.5	18.3	10.1	17.1	13.9	13.3
		標準誤差	0.8	4.0	6.1	5.5	3.8	3.3	2.7	2.9	2.2	2.1	1.8
	4.3合以上4合(720ml)未満	割合	11.9	8.5	8.1	10.7	6.3	3.3	7.8	9.2	6.8	7.9	8.1
		標準誤差	11.0	3.7	2.6	4.6	3.6	1.9	1.8	3.2	1.8	1.7	2.1
	5.4合以上5合(900ml)未満	割合	12.8	2.2	3.8	0.0	0.0	0.0	1.0	5.5	0.0	2.5	2.9
		標準誤差	6.3	1.6	2.4	0.0	0.0	0.0	0.7	1.9	0.0	0.9	1.1
	6.5合(900ml)以上	割合	5.6	3.6	2.9	1.2	1.3	2.5	1.6	3.9	1.6	2.6	2.8
		標準誤差	4.1	2.2	2.3	1.2	1.3	2.5	0.8	1.5	1.0	0.9	1.0
	7.未回答	割合	0.0	0.9	0.0	0.7	0.0	0.0	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3
		総数	27	55	75	85	75	79	266.0	157.0	239.0	396	
女性	1.1合(180ml)	割合	43.9	41.9	67.5	69.2	81.8	90.2	72.8	52.1	80.0	65.7	65.9
		標準誤差	11.0	9.3	8.1	7.7	5.5	6.8	4.8	4.4	4.1	3.2	3.4
	2.1合以上2合(360ml)未満	割合	31.3	30.4	25.8	27.4	16.5	9.8	23.5	28.9	18.2	23.7	23.5
		標準誤差	11.9	8.7	6.3	7.3	5.7	6.8	4.5	4.0	4.1	3.2	3.3
	3.2合以上3合(540ml)未満	割合	15.9	15.7	6.8	2.1	0.0	0.0	2.8	12.2	0.8	6.6	6.6
		標準誤差	10.8	6.8	4.7	1.7	0.0	0.0	1.8	3.5	0.6	2.0	2.2
	4.3合以上4合(720ml)未満	割合	1.6	5.2	0.0	1.3	1.7	0.0	0.8	2.3	1.0	1.7	1.7
		標準誤差	1.6	3.8	0.0	1.4	1.7	0.0	0.6	1.4	0.7	0.8	0.8
	5.4合以上5合(900ml)未満	割合	3.8	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.8	0.8
		標準誤差	2.9	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.5	0.5
	6.5合(900ml)以上	割合	0.0	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	1.0	1.0
		標準誤差	0.0	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	1.0	1.0
	未回答	割合	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.5	0.5
		総数	25	32	51	53	29	30	145	108	112	220	

注)

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH22人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

性別	回 答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 40-74歳 ※1	(再掲) 20-49歳 ※1	(再掲) 50歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
総数	1.1合(180ml)	割合	43.1	34.9	56.2	46.7	58.1	73.9	55.6	44.6	59.4	52.3	55.1
		標準誤差	6.5	5.7	4.5	4.3	5.5	5.5	2.3	2.9	2.8	2.0	2.3
	2.1合以上2合(360ml)未満	割合	29.0	39.9	23.1	27.2	24.2	17.3	24.4	30.3	22.9	26.4	25.9
		標準誤差	7.5	5.0	3.4	3.8	4.3	4.7	2.5	2.9	2.5	2.1	2.1
	3.2合以上3合(540ml)未満	割合	8.4	11.1	12.7	17.6	11.9	5.0	12.9	10.9	11.6	11.3	9.9
		標準誤差	6.0	4.3	3.3	3.2	3.0	2.3	1.7	2.8	1.7	1.7	1.4
	4.3合以上4合(720ml)未満	割合	6.7	7.3	4.4	7.3	4.9	2.2	5.3	6.5	4.9	5.6	4.9
		標準誤差	5.4	2.6	1.5	3.1	2.6	1.3	1.2	2.0	1.3	1.1	1.1
	5.4合以上5合(900ml)未満	割合	8.3	1.9	2.1	0.0	0.0	0.0	0.7	4.0	0.0	1.9	1.9
		標準誤差	4.0	1.4	1.2	0.0	0.0	0.0	0.5	1.3	0.0	0.7	0.6
	6.5合(900ml)以上	割合	2.7	4.2	1.6	0.8	0.9	1.6	1.0	3.1	1.1	2.0	1.9
		標準誤差	2.1	2.2	1.2	0.8	0.9	1.7	0.5	1.4	0.7	0.8	0.7
	未回答	割合	1.8	0.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.2	0.6	0.2	0.4	0.4
		総数		52	87	126	138	104	109	411	265	351	616

注)

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH22人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

問24-2 お酒を飲む日は1日あたり、どのくらいの量を飲みますか。下の表を参考に日本酒に換算し、あてはまるもの1つだけ選んで○印をつけてください。

(問24で(1)、(2)、(3)、(4)、(5)のうちのどれかに○印をつけた人のみ回答)

問24-3 多量飲酒者の割合(1日に純アルコールで約60gを超えて多量に飲酒する人の割合)

性別	回 答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 40-74歳 ※1	(再掲) 20-49歳 ※1	(再掲) 50歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2	
男性	1.多量飲酒	割合	14.5	5.7	6.1	3.9	5.8	3.0	4.7	8.2	4.2	6.0	6.3	
		標準偏差	8.6	2.4	2.3	1.6	2.9	1.8	1.2	2.6	1.3	1.4	1.6	
		飲酒日1日当たり5合以上	割合	4.1	2.6	2.2	1.0	1.0	1.6	1.2	2.8	1.2	1.9	2.0
		飲酒日1日当たり4合以上5合未満 飲酒頻度が週5日以上	割合	1.7	1.5	1.9	0.0	0.0	0.0	0.5	1.7	0.0	0.8	0.8
		飲酒日1日当たり3合以上4合未満 で飲酒頻度が毎日	割合	8.8	1.7	2.0	2.9	4.8	1.4	3.0	3.6	3.0	3.3	3.5
	2.その他	割合	85.5	94.3	93.9	96.1	94.2	97.0	95.3	91.8	95.8	94.0	93.7	
		総数	39	77	99	107	95	127	347	215	329	544		
女性	1.多量飲酒	割合	1.1	2.6	0.0	0.6	0.5	0.0	0.3	1.3	0.3	0.7	0.8	
		標準偏差	1.2	2.5	0.0	0.6	0.5	0.0	0.2	1.0	0.2	0.4	0.5	
		飲酒日1日当たり5合以上	割合	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.4	0.5	
		飲酒日1日当たり4合以上5合未満 飲酒頻度が週5日以上	割合	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	0.2	
		飲酒日1日当たり3合以上4合未満 で飲酒頻度が毎日	割合	0.0	0.0	0.0	0.6	0.5	0.0	0.3	0.3	0.2	0.2	
	2.その他	割合	98.9	97.4	100.0	99.4	99.5	100.0	99.7	98.7	99.7	99.3	99.2	
		総数	49	67	113	108	102	156	365	229	366	595		
総数	1.多量飲酒	割合	6.6	4.4	2.6	2.3	3.1	1.3	2.5	4.8	2.1	3.2	3.6	
		標準偏差	3.5	1.6	1.0	0.9	1.4	0.7	0.6	1.5	0.6	0.7	0.8	
		飲酒日1日当たり5合以上	割合	1.7	2.6	1.0	0.5	0.5	0.7	0.6	1.9	0.5	1.1	1.2
		飲酒日1日当たり4合以上5合未満 飲酒頻度が週5日以上	割合	1.4	0.9	0.8	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0	0.0	0.4	0.5
		飲酒日1日当たり3合以上4合未満 で飲酒頻度が毎日	割合	3.6	0.9	0.8	1.8	2.6	0.6	1.7	1.8	1.6	1.7	1.8
	2.その他	割合	93.4	95.6	97.4	97.7	96.9	98.7	97.5	95.2	97.9	96.8	96.4	
		総数	88	144	212	215	197	283	712	444	695	1139		

注)

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH22人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

問25 アルコール依存症又はその回復者は、今後一切お酒を断つことが必要だと知っているかどうか。

性別	回 答	年齢区分	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 40-74歳 ※1	(再掲) 20歳以上 ※1	(再掲) 20歳以上 ※2
男性	1.知っている	割合	34.1	52.6	60.7	58.1	67.0	66.0	64.4	57.3	56.6
		標準誤差	10.9	5.1	7.5	7.1	6.9	5.3	3.7	3.2	2.9
	2.知らない	割合	65.9	47.4	39.3	41.9	33.0	34.0	35.6	42.7	43.4
	総数		38	66	86	99	76	103	297	468	
女性	1.知っている	割合	54.6	65.3	63.3	69.3	74.5	65.1	71.1	65.8	65.5
		標準誤差	9.4	7.0	6.6	4.0	5.2	4.2	2.9	2.8	2.5
	2.知らない	割合	45.4	34.7	36.7	30.7	25.5	34.9	28.9	34.2	34.5
	総数		47	58	98	100	80	135	310	518	
総数	1.知っている	割合	46.2	58.2	62.2	63.7	70.8	65.5	67.8	61.7	61.1
		標準誤差	7.2	4.3	6.3	4.3	3.7	3.9	2.4	2.1	1.9
	2.知らない	割合	53.8	41.8	37.8	36.3	29.2	34.5	32.2	38.3	38.9
	総数		85	124	184	199	156	238	607	986	

注)

・値は保健所ごとの標本数の偏りを調整するための重み付けをして算出している。

※1 保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けと県の実際のH22人口構成に合わせるための重み付けをした値。

※2 ※1同様に保健所圏域ごとの標本数の偏りを調整する重み付けとH17国勢調査男女計人口を基準に重み付けをした値。

問25 あなたはアルコール依存症又はその回復者は、今後一切お酒を断つことが必要だと知っていますか。1つだけ選んで○印をつけてください