

接種は無料
(公費負担)

教えて!!



正しく
知ろう!
新型コロナ
ワクチンのこと

新型コロナウイルス ワクチン

発症 予防 効果

95%

他のワクチン
だと…

麻疹
ワクチン
95%

インフルエンザ
ワクチン
50%

- ✓ 重症化予防効果あり
- ✓ 高齢者への有効性も高い
- ✓ 人にうつす可能性を減らす効果が期待



接種の流れ

1回目
2回目



- ✓ 他のワクチンを2週間以内に接種
- ✓ 明らかに発熱（37.5℃以上）
- ✓ 重い急性疾患にかかっている



相談

接種1回目



2回接種で望ましい効果

3週間あけて

接種2回目



副反応が出ても
2回目接種OK

アナフィラキシー
が出た 2回目



相談



接種当日と翌日は可能なら
予定を空けておくのがおすすめ

接種当日

接種後
待機



- アレルギーなし15分待機
- アレルギーあり30分待機

接種後
当日



- 入浴OK
- 激しい運動は避ける
- 過度なアルコール摂取は控える

感染対策は続ける

接種後は

接種後



感染対策は
続ける

1 接種
回目

2 接種
回目

接種後
7日目
以降



1回目の接種から
2週間は打っていない
人と同じと考えて
行動を

十分な効果



理由 1 効果の持続期間が不明

理由 2 みんなが免疫を得るまで時間がかかる

副反応



ほとんどは
3日以内に回復

- ✓ 2回目接種後により強く起こりやすい
- ✓ 接種した1~2日後に出現しやすい
- ✓ ほとんどは3日以内に回復
- ✓ 発熱時は解熱剤を使ってもOK

主な副反応

- 接種時の痛み
- だるさ
- 頭痛
- 筋肉痛
- 寒気
- 発熱
- 接種部位の腫れ
- 関節痛
- 吐き気



1~2日後
に出ることが
ある

1番多

接種部位
の痛み



だるさ



筋肉痛



頭痛

アナフィラキシー



数分~
数時間
以内


- ✓ 「強いアレルギー反応」のこと
- ✓ 短時間で右の2つ以上の症状が出現する場合のこと
- ✓ 90% が 30 分以内
- ✓ 治療できる

- 皮膚・粘膜症状
- 循環器症状
- 消化器症状
- 呼吸器症状

アナフィラキシーショックって？

アナフィラキシーのうち血圧低下や意識レベル低下を伴うもの。

アナフィラキシーは 治療できます



アドレナリン
の筋肉注射

治療により
回復し後遺症は
残りません



必要なら酸素投与




横になって安静

こんな場合は 医療機関へ

- 症状が重い
- 接種後 2 日以上
経っても解熱
しない



副反応が出ても
よくある症状なら
様子を見て
落ち着いた判断を






接種できます

- アレルギー
- 基礎疾患
- 妊娠中
- 授乳中
- 薬を内服中
- 手術後
- 1回目の接種後 副反応が出た




不安な場合は
かかりつけ医
に相談を






接種できません

- 当日の発熱
- 重い急性疾患
- 16才未満
- 他のワクチンを
2週間以内に接種
- 1回目の接種後
アナフィラキシー



インフルエンザ
ワクチン接種の
時期に注意！



相談窓口

ワクチンの接種に関する不安や、副反応についての相談など

長野県ワクチン接種相談センター

TEL: 026-235-7380 8:30-21:00 (無休)
※5/10以降
24時間無休 (予定)

FAX: 026-403-0320 9:00-17:00 (土日・祝日除く)

接種の予約・手続きの方法など
各市町村接種相談窓口

接種に関する個別の事前相談
かかりつけ医