

# 家畜衛生広報



## ながの

長野家畜保健衛生所  
北信家畜産物衛生指導協会  
〒380-0944 長野市安茂里米村1993  
Tel 026-226-0923 Facs. 026-227-2665  
E-mail:nagakachiku@pref.nagano.lg.jp

### モトから絶つ！ ハエ対策は今から！

初夏から秋まで、なにかと迷惑なハエ。ハエ対策は発生してからでは遅すぎます。ハエは、モトから絶たなきゃダメ！それには今からの対策が重要です。

【ハエの種類】 畜舎で問題となるハエは、主にイエバエとサシバエの2種類です。


	イエバエ	サシバエ
特徴	全畜種で見られる	主に牛舎で見られる
食性	雑食性:糞、腐敗物など	動物の血液(特に牛を好む)
発生源	有機物の多い場所(床、堆肥場など)	掃除がされず長く糞などがある場所
産卵数	50-100個(4~6回産卵)	300-800個(3~4回産卵)

写真:wikipediaより

### 【幼虫の対策】 糞の除去と IGR 剤散布

幼虫の段階で数を増やさないことが対策の最も重要なポイントです。

- ・糞尿は定期的に除去
- ・堆肥は十分に発酵(47℃以上で死滅)
- ・IGR 剤や殺虫剤で幼虫を殺虫



卵や幼虫を発育させない

### 《サシバエの場合》

畜舎の隅、飼槽・水槽の下、マットの隙間や下、カーフハッチ周囲などが発生源  
(幼虫は清掃しにくく牛に踏まれにくいところにいます)

IGR 剤(昆虫発育抑制剤:ネボレックス、バイパック、サイクラテなど)を定期的に散布

通年で IGR 剤を 2 週間隔で散布し、ハエの大量発生をゼロにした事例があります

### 【その他の対策】

- ・成虫対策には、殺虫剤の直接散布や誘引殺虫剤を使用
- ・畜舎内外を移動するサシバエには、防虫ネットも効果的と言われています

ご不明な点は家畜保健衛生所へお問い合わせください。(担当:環境指導課)

参考:兵庫県立農林水産技術総合センター

[http://hyogo-nourinsuisangc.jp/19-kenkyu/23/kenkyu-2306\\_1.html](http://hyogo-nourinsuisangc.jp/19-kenkyu/23/kenkyu-2306_1.html)



消毒は伝染病予防の第一歩  
まずは踏み込み消毒槽を畜舎に置きましょう

◆◆「オール信州」宣言 ◆◆  
私たちは「長野県人口定着・確かな暮らし実現総合戦略」の実現に取り組んでいます。