

令和7年度 果樹生態調査結果表

南信州農業農村支援センター
技 術 経 営 普 及 課

6月9日 現在

1 りんご

品種	調査地点	標高(m)	年度	発芽	-	展葉	開花始	満開	落花	備考
シナノリップ	飯田市 座光寺	540	6年平均	3月21日		4月1日	4月15日	4月22日	4月27日	平年差 +4日 昨年差 +5日
			R6	3月19日		4月1日	4月15日	4月21日	4月26日	
			R7	3月26日		3月31日	4月18日	4月22日	5月1日	
つがる	豊丘村 河野	430	9年平均	3月24日		4月5日	4月16日	4月22日	4月29日	平年差 -1日 昨年差 ±0日
			R6	3月29日		4月5日	4月15日	4月21日	4月28日	
			R7	3月26日		4月7日	4月18日	4月22日	4月28日	
シナノスイート	飯田市 殿岡	500	3年平均	3月22日		4月1日	4月14日	4月20日	4月27日	平年差 +3日 昨年差 +2日
			R6	3月27日		4月3日	4月15日	4月22日	4月28日	
			R7	3月26日		4月7日	4月20日	4月23日	4月30日	
ふじ	松川町 元大島	600	10年平均	3月27日		4月6日	4月19日	4月25日	5月1日	平年差 ±0日 昨年差 -1日
			R6	3月30日		4月5日	4月19日	4月24日	5月2日	
			R7	3月27日		4月8日	4月20日	4月23日	5月1日	

平均値 シナノリップ（2016-2024年）、つがる（2016-2024年）、ふじ（2015-2024年）の平均値

2 日本なし

品種	調査地点	標高(m)	年度	発芽	りん片脱落	展葉	開花始	満開	落花	備考
幸水	飯田市 座光寺	430	8年平均	3月30日	4月5日	4月10日	4月12日	4月16日	4月23日	平年差 +1日 昨年差 ±0日
			R6	3月31日	4月5日	4月8日	4月13日	4月15日	4月24日	
			R7	3月28日	4月7日	4月13日	4月16日	4月18日	4月24日	
南水	飯田市 座光寺	410	9年平均	3月30日	4月4日	4月10日	4月10日	4月13日	4月21日	平年差 +1日 昨年差 ±0日
			R6	4月1日	4月6日	4月12日	4月12日	4月14日	4月22日	
			R7	3月31日	4月8日	4月12日	4月12日	4月16日	4月22日	
南農ナシ6号	松川町 大島	630	R7	(欠測)	4月11日	4月19日	4月17日	4月21日	4月24日	R7から調査開始

平均値 幸水（2017-2024年）、南水（2016-2024年）の平均値

3 ぶどう

品種	調査地点	標高(m)	年度	発芽	-	展葉	開花始	満開	落花	備考
シャイン マスカット	高森町 山吹	440	8年平均	4月17日		4月26日	6月4日	6月9日	6月11日	平年差 -3日 昨年差 +5日
			R6	4月15日		4月21日	5月27日	5月31日	6月3日	
			R7	4月20日		4月24日	6月2日	6月5日	6月8日	
長果G11 (クイーンルージュ®)	飯田市 駄科	490	4年平均	4月17日		4月22日	6月3日	6月7日	6月10日	平年差 -1日 昨年差 +2日
			R6	4月15日		4月22日	5月30日	6月4日	6月7日	
			R7	4月19日		4月24日	6月3日	6月6日	6月9日	

平均値 「シャインマスカット」（2017-2024年）、「クイーンルージュ®」（2020-2024年）の平均値

(注) 「シャインマスカット」調査園はR5から簡易雨よけ栽培での値。

4 もも・かき

品種	調査地点	標高(m)	年度	発芽	-	展葉	開花始	満開	落花	備考
あかつき	高森町 山吹	440	10年平均	3月20日		4月8日	4月4日	4月9日	4月17日	平年差 +3日 昨年差 +3日
			R6	3月27日		4月7日	4月3日	4月9日	4月17日	
			R7	3月24日		4月9日	4月7日	4月13日	4月20日	
市田柿	飯田市 座光寺	430	9年平均	3月27日		4月10日	5月18日	5月21日	5月25日	平年差 -3日 昨年差 +4日
			R6	3月31日		4月10日	5月11日	5月13日	5月18日	
			R7	3月27日		4月13日	5月16日	5月18日	5月22日	

平均値 あかつき（2015-2024年）、市田柿（2016-2024年）の平均値