



・病虫害防除

生育期間中の防除は、動力噴霧機、または、ブームスプレーヤ（写真）で行います。害虫の防除はチョウ目害虫が主体で、病害の防除は花らいを腐らせる黒すす病と軟腐病が主になります。



・収穫と出荷

収穫（写真）は朝夕の涼しい時間帯に行います。定植から50～60日後で、花らい直径12～14cmのものを順次収穫していきます。

畑で外葉を取り除いた後、作業場で規格に合わせて再調製します。スチロール箱に詰め、速やかに集荷場へ持ち込みます。



・鮮度保持

ブロッコリーは、常温では花らいの黄化による品質低下が急速に進みます。

集荷場でスチロール箱にフレイク氷を敷き詰めた後（写真）、市場に向けて発送されます。

・栽培期間

3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月		
上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
は種（育苗日数 春まき25～35日、初夏まき25日）																							
定植可能期間（降霜期はべた掛け栽培）																							
収穫（定植後日数 初夏・夏どり50～55日 春・秋どり55～65日）																							

・標準的な栽培スケジュール

定植後 ▲25日	▲15日	▲5日	5日	15日	25日	35日	45日	55日	65日	
は種	育苗期間		定植	生育期間					収穫	
緑肥すき込み	施肥	根こぶ病防除	うね立て	追肥	土寄せ	防除期間（春10日間隔 夏7日間隔前後）			すき込み	緑肥は種